

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Spray INSECTOL

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.
- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Întreprinderea Particulară „O.L. KAR-AgroZooVet-Service”

str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272B, or. Șargorod, reg. Vinița, 23500, Ucraina

tel. / fax: (0432) 55-14-28, (0432) 55-14-27

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Spray INSECTOL

1 ml de medicament conține:

Substanța activă:

Deltametrin - 0,25 mg.

Lista excipienților:

Alcool izopropilic, ulei de ricin, apă distilată.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE (pe specii țintă)

Tratamentul și prevenirea infectării cu ectoparaziți a câinilor și a pisicilor:

- purici (*Ctenocephalus canis*, *Ctenocephalus felis*);
- păduchi (*Linognathus setosus*);
- malofagi (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*);
- acarienii scabiei (*Otodectes spp.*);
- căpușe parazitiforme (ixodide) (*Dermacentor pictus*, *Dermacentor marginatus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus*).



4. CONTRAINDICAȚII

A nu se trata animalele bolnave, emaciate și slăbite, precum și cățele și pisoii cu vârsta de până la două luni.

A nu se utiliza animalelor sensibile la componentele medicamentului.

5. REACȚII ADVERSE

La animalele sensibile după tratament sunt posibile salivația și agitația.

Aceste fenomene dispar de obicei de la sine. În caz de otrăvire accidentală, se efectuează terapia simptomatică.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini și pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

-*Extern.* Medicamentul se aplică pe blana și pielea animalelor prin pulverizare timp de câteva secunde împotriva sensului de creștere a părului până la o ușoară umezire a blănii.

În funcție de gradul de infectare cu ectoparaziți prelucrarea repetată se efectuează peste 10-14 zile.

Doza de medicament constituie:

pisici: 0,8 ml de medicament (6 pulverizări);

căței și pisici mici: 0,4 ml de medicament (3 pulverizări);

câini: cu greutatea corporală 2-10 kg - 0,8 ml de medicament (6 pulverizări);

cu greutatea corporală 10-20 kg - 1,6 ml de medicament (12 pulverizări);

cu greutatea corporală 20-40 kg - 2,4 ml de medicament (18 pulverizări);

cu greutatea corporală mai mare de 40 kg - 3,2 ml de medicament (24 pulverizări).

*O pulverizare se efectuează în decurs de o secundă.

-În locurile de întreținere și odihnă a animalelor și în alte locuri unde pot exista paraziți (așternuturi, covorașe, crăpături în podea și mobilier) se pulverizează de la o distanță de 30-40 cm din calculul de 10 ml de medicament (75 pulverizări) la 1 m².

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

În loc uscat, ferit de lumină, inaccesibil copiilor, plasat la temperaturi de la +0°C până la +35°C.

A nu se păstra cu alimente, băuturi și hrana pentru animale.



10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

Medicamentul nu trebuie să fie deversat în cursuri de apă datorită pericolului pentru pești și alte organisme acvatice. Nu contaminați lacurile cursurile de apă sau canalizarea cu medicamentul sau cu ambalajul acestuia.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE (interdicții)

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Nu sunt.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Nu depășiți doza recomandată.

Tratamentul cu medicament se efectuează în aer liber sau într-o încăpere bine ventilată, ținând animalul până la uscarea completă a blănii.

Evitați contactul medicamentului cu ochii animalului. Nu aplicați spray-ul direct pe pielea lezată.

Nu plasați animalele în spații închise sau cuști pentru transportul animalelor de companie înainte ca blana să fie complet uscată.

Este important să vă asigurați că animalele după tratament nu pot să se lingă pe blană, unul pe celălalt.

Țineți animalele tratate departe de foc sau alte surse de căldură și de suprafețele susceptibile să fie afectate de spray-ul alcoolic, timp de cel puțin 30 de minute după aplicarea spray-ului sau până la uscarea completă a blănii.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului se interzice fumatul, consumul de alimente și băuturi.

În caz de tratare a unui număr mare de animale se recomandă utilizarea unui respirator.

Acest medicament este iritant pentru ochi și mucoase. De aceea, contactul acestui medicament cu ochii sau gura trebuie evitat. În caz de contact accidental cu ochii, se va clăti imediat și abundent zona cu apă.

A nu se pulveriza în apropierea unei flăcări deschise, a nu permite supraîncălzirea medicamentului.

În caz de contact cu medicament sunt posibile reacții alergice (strănut, lacrimare), care repede trec.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la deltametrin sau excipienți trebuie să evite contactul cu medicamentul de uz veterinar. Evitați contactul conținutului cu degetele.

În caz de contact accidental al medicamentului cu pielea sau mucoasele, spălați imediat cu multă apă, iar dacă medicamentul a pătruns în interior – consultați imediat medicul.





La finisarea prelucrării spălați bine mâinile cu apă caldă și săpun.

Se interzice scăldatul și dezmiardarea animalelor timp de 48 de ore după prelucrare.

Copiilor nu trebuie să li se permită să se joace cu animalele tratate până după uscarea locului de aplicare. De aceea, se recomandă ca animalele să nu fie tratate pe timpul zilei, ci seara devreme, iar animalelor recent tratate nu trebuie să li se permită să doarmă cu proprietarii acestora și, în special cu copii.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

A nu se trata animalele în perioada estrusului, alăptării și de gestație.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Interacționează cu agenți oxidanți și halogeni.

Supradozare:

Riscul efectelor adverse poate crește la supradozare. În caz de supradozare se va institui un tratament simptomatic.

Incompatibilități:

Medicamentul este incompatibil cu hidratul de cloral, fenolul, timolul, salolul, mentolul.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

Perioada de valabilitate a medicamentului de uz veterinar după prima deschidere a ambalajului primar: 1 an.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacoane din polimer cu pulverizator a câte 30, 50, 75, 100, 150, 200 ml.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

04.2022

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

