

## REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

### 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

INSECTOL Spray

### 2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

1 ml de medicament:

**Substanța activă:**

Deltametrin - 0,25 mg.

**Excipienți:**

Alcool izopropilic, ulei de ricin, apă distilată.

### 3. FORMA FARMACEUTICĂ

Spray cu aplicare cutanată, soluție.

Lichid transparent de culoare galben deschis cu miros specific.

### 4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

#### 4.1 Specii-țintă:

Câini și pisici.

#### 4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor-țintă:

Tratamentul și prevenirea infectării cu ectoparaziți a câinilor și a pisicilor:

- purici (*Ctenocephalus canis*, *Ctenocephalus felis*);
- păduchi (*Linognathus setosus*);
- malofagi (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*);
- acarienii scabiei (*Otodectes spp.*);
- căpușe parazitiforme (ixodide) (*Dermacentor pictus*, *Dermacentor marginatus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus*).

#### 4.3 Contraindicații:

A nu se trata animalele bolnave, emaciate și slăbite, precum și cățele și pisoii cu vârsta de până la două luni.

A nu se utiliza animalelor sensibile la componentele medicamentului.

#### 4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Nu sunt.



#### **4.5 Precauții speciale pentru utilizare:**

##### **4.5.1 Precauții speciale pentru utilizare la animale:**

Nu depășiți doza recomandată.

Tratamentul cu medicament se efectuează în aer liber sau într-o încăpere bine ventilată, ținând animalul până la uscarea completă a blănii.

Evitați contactul medicamentului cu ochii animalului. Nu aplicați spray-ul direct pe pielea lezată. Nu plasați animalele în spații închise sau cuști pentru transportul animalelor de companie înainte ca blana să fie complet uscată.

Este important să vă asigurați că animalele după tratament nu pot să se lingă pe blană, unul pe celălalt.

Țineți animalele tratate departe de foc sau alte surse de căldură și de suprafețele susceptibile să fie afectate de spray-ul alcoolic, timp de cel puțin 30 de minute după aplicarea spray-ului sau până la uscarea completă a blănii.

##### **4.5.2 Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:**

În timpul lucrului se interzice fumatul, consumul de alimente și băuturi.

În caz de tratare a unui număr mare de animale se recomandă utilizarea unui respirator.

Acest medicament este iritant pentru ochi și mucoase. De aceea, contactul acestui medicament cu ochii sau gura trebuie evitat. În caz de contact accidental cu ochii, se va clăti imediat și abundant zona cu apă.

A nu se pulveriza în apropierea unei flăcări deschise, a nu permite supraîncălzirea medicamentului.

În caz de contact cu medicament sunt posibile reacții alergice (strănut, lacrimare), care repede trec.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la deltametrin sau excipienți trebuie să evite contactul cu medicamentul de uz veterinar. Evitați contactul conținutului cu degetele.

În caz de contact accidental al medicamentului cu pielea sau mucoasele, spălați imediat cu multă apă, iar dacă medicamentul a pătruns în interior – consultați imediat medicul.

La finisarea prelucrării spălați bine mâinile cu apă caldă și săpun.

Se interzice scăldatul și dezmiardarea animalelor timp de 48 de ore după prelucrare.

Copiilor nu trebuie să li se permită să se joace cu animalele tratate până după uscarea locului de aplicare. De aceea, se recomandă ca animalele să nu fie tratate pe timpul zilei, ci seara devreme, iar animalelor recent tratate nu trebuie să li se permită să doarmă cu proprietarii acestora și, în special cu copii.

##### **4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate):**

La animalele sensibile după tratament sunt posibile salivăția și agitația.

Aceste fenomene dispar de obicei de la sine. În caz de otrăvire accidentală, se efectuează terapia simptomatică.



#### 4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

A nu se trata animalele în perioada estrusului, alăptării și de gestație.

#### 4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Interacționează cu agenți oxidanți și halogeni.

#### 4.9 Doză și calea de administrare:

-*Extern.* Medicamentul se aplică pe blana și pielea animalelor prin pulverizare timp de câteva secunde împotriva sensului de creștere a părului până la o ușoară umezire a blănii.

În funcție de gradul de infectare cu ectoparaziți prelucrarea repetată se efectuează peste 10-14 zile.

Doza de medicament constituie:

*pisici:* 0,8 ml de medicament (6 pulverizări);

*căței și pisici mici:* 0,4 ml de medicament (3 pulverizări);

*câini:* cu greutatea corporală 2-10 kg - 0,8 ml de medicament (6 pulverizări);

cu greutatea corporală 10-20 kg - 1,6 ml de medicament (12 pulverizări);

cu greutatea corporală 20-40 kg - 2,4 ml de medicament (18 pulverizări);

cu greutatea corporală mai mare de 40 kg - 3,2 ml de medicament (24 pulverizări).

\*O pulverizare se efectuează în decurs de o secundă.

-În locurile de întreținere și odihnă a animalelor și în alte locuri, unde pot exista paraziți (așternuturi, covorașe, crăpături în podea și mobilier), se pulverizează de la o distanță de 30-40 cm din calculul de 10 ml de medicament (75 pulverizări) la 1 m<sup>2</sup>.

#### 4.10 Supradozare:

Riscul efectelor adverse poate crește la supradozare. În caz de supradozare se va institui un tratament simptomatic.

#### 4.11 Perioada de așteptare:

Nu este cazul.

### 5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

#### 5.1 Proprietăți farmacodinamice:

**5.1.1 Grupa farmacoterapeutică:** ATC vet QP53AC insecticide, piretrine și piretroide;  
QP53AC11 deltametrin.

#### 5.1.2 Mecanism de acțiune:

Deltametrin (substanța activă a medicamentului) este un piretroid sintetic care acționează asupra ectoparaziților ca otravă de contact direct, blochează transmiterea impulsurilor nervoase de către nervii periferici ganglionari, provocând paralizia și moartea paraziților.





Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor  
MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63  
ÎNREGISTRAREA DE STAT  
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR  
**APROBAT**

### 5.1.3 Efecte farmacodinamice:

Molecula de deltametrin aparține familiei piretroidelor sintetice. Se caracterizează prin activitate insecticidă și acaricidă, acționând prin alterarea permeabilității moleculelor canalelor de sodiu cauzând o stare de hiperexcitare, urmată de paralizie (efect de knockdown), cu tremor și moartea parazitilor. Două mecanisme fiziologice contribuie probabil la rezistența la deltametrin: mutația țintei moleculare a deltametrinului sau selecția genomică pentru expresia crescută a oxidazei mitocondriale și a enzimelor din grupa esterazelor

### 5.1.4 Eficacitate și siguranță clinică:

Medicamentul de uz veterinar, spray insecto-acaricid Insectol soluție pentru uz extern, prezintă o înaltă eficiență și siguranță de utilizare la câini și pisici. Medicamentul poate fi cu ușurință administrat în orice condiții. Aceste aspecte diminuează în sine costul măsurilor de tratament și profilaxie, precum și riscurile de apariție a reacțiilor adverse și intoxicațiilor. Medicamentul este recomandat pentru tratamentul și profilaxia infestațiilor cu căpușe, purici și păduchi la pisici și câini.

Moderat toxic pentru animalele cu sânge cald.

### 5.2 Proprietăți farmacocinetice

După aplicare cutanată, deltametrinul este ușor absorbit prin pielea câinelor și pisicilor. Piretroidele sunt metabolizate pe căi oxidative și neurotoxice. Principala cale de excreție a cantității absorbite la animalele țintă este prin fecale.

## 6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

### 6.1 Lista excipienților:

Alcool izopropilic, ulei de ricin, apă distilată.

### 6.2 Incompatibilități:

Medicamentul este incompatibil cu hidratul de cloral, fenolul, timolul, salolul, mentolul.

### 6.3 Perioada de valabilitate:

Perioada de valabilitate a medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

### 6.4 Condiții speciale pentru depozitare:

În loc uscat, ferit de lumină, inaccesibil copiilor, plasat la temperaturi de la +0°C până la +35 °C. A nu se păstra cu alimente, băuturi și hrana pentru animale.

### 6.5 Natura și compoziția ambalajului primar:

Flacoane din polimer cu pulverizator a câte 30, 50, 75, 100, 150, 200 ml.





**6.6 Măsurile speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar neutralizate, sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:**

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

Medicamentul nu trebuie să fie deversat în cursuri de apă datorită pericolului pentru pești și alte organisme acvatice. Nu contaminați lacurile, cursurile de apă sau canalizarea cu medicamentul sau cu ambalajul acestuia.

**7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE**

Întreprinderea Particulară „O.L. KAR-AgroZooVet-Service”

str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272B, or. Șargorod, reg. Vinița, Ucraina, 23500

tel.: +38 (043) 442-12-54, fax: +38 (043) 442-17-87

e-mail: [vet@olkar.com.ua](mailto:vet@olkar.com.ua), [www.agroolkar.com.ua](http://www.agroolkar.com.ua)

**8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE**

220009

**9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE**

01.04.2022

**10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI**

04.2022

