

APROBAT

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Unguent camforat 10%.

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

100 g conține:

Substanța activă:

Camfor – 10 g

Excipienți:

Compoziția calitativă a excipienților a altor constituenți	Compoziția cantitativă
lanolin	30 g
vazelină	60 g

Unguent de uz extern.

Se prezintă ca o masă omogenă, de culoare galbenă de diferite nuanțe și miros specific de camfor.

3. INFORMAȚII CLINICE

3.1 Specii țintă

Bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine, câini, pisici.

3.2 Indicații de utilizare pentru fiecare specie țintă

Unguentul camforat 10% se indică în tratamentul artritelor, bursitelor, tendovaginitelor, miozitelor la animale și în mastită subclinică la vaci în repaos mamă.

3.3 Contraindicații

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

3.4 Atenționări speciale

Utilizarea unguentului la animalele nou-născute se determină de către medicul veterinar responsabil în baza evaluării raportului beneficiu-risc.

3.5 Precauții speciale pentru utilizare

Precauții special pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă

Unguentul nu trebuie aplicat pe zonele lezate ale pielii.

Particularități deosebite de acțiune a medicamentului de uz veterinar la prima administrare sau în caz de anulare nu s-au stabilit.

Se recomandă respectarea termenilor de tratament recomandate pentru a nu diminua eficiența terapeutică. În caz de omitere a unei administrări, utilizarea se reia în aceeași doză, conform aceeași scheme, în continuare intervalul între administrări nu se va schimba.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu Unguentul camforat 10%, e important de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.

La finisarea lucrului mâinile se spală cu apă caldă și săpun.

În caz de contact accidental cu pielea sau tunicile mucoase oculare, acestea se spală din abundență cu apă. Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă trebuie să evite contactul cu medicamentul de uz veterinar.

În caz de ingerare sau apariție a reacțiilor alergice e necesar de adresat la o instituție medicală (cu sine de avut eticheta sau prospectul de utilizare).

Precauții speciale pentru protecția mediului

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

3.6 Evenimente adverse

Reacții adverse sau complicații în urma administrării conform prospectului de utilizare nu apar.

În caz de sensibilitate sporită a animalului la componentele unguentului pot apărea reacții individuale (iritarea pielii, amețeală sau excitare). În astfel de cazuri, tratamentul se stopează, cu un tampon se șterge unguentul de pe suprafața pielii și se spală cu apă, iar animalului i se indică antihistaminice și terapie simptomatică

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței medicamentului de uz veterinar. Rapoartele se trimit, de preferință prin medicul veterinar, fie deținătorului certificatului de înregistrare sau reprezentantului local al acestuia, fie Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor prin sistemul național de raportare. Consultați, de asemenea, secțiunea 16 din prospect pentru datele de contact respective.

3.7 Utilizare în timpul gestației, lactației sau a ouatului

Gestație

Utilizarea unguentului la femelele gestante se determină de către medicul veterinar responsabil în baza evaluării raportului beneficiu-risc.

Lactație

Nu se recomandă utilizarea unguentului femelelor în perioada de lactație.

3.8 Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune

A nu se utiliza concomitent cu alte medicamente de uz veterinar topice cu aceleași indicații.

3.9 Căi de administrare și dozaj

Unguentul se utilizează extern, aplicându-l în strat subțire cu o spatulă, cu un tifon din bumbac sau cu mâna folosind mănușă sterilă pe suprafața afectată și fricționând ușor timp de 2-3 minute, de 1-2 ori pe zi, timp de 10 - 12 zile.

3.10 Simptome de supradozaj (și după caz, proceduri de urgență și antidoturi)

Nu au fost depistate simptome specifice supradozării.

3.11 Restricții special de utilizare și condiții special de utilizare, inclusive restricții privind utilizarea medicamentelor de uz veterinar antimicrobiene și antiparazitare, pentru a limita riscul de dezvoltare a rezistenței

Nu este cazul.

3.12 Perioada de așteptare

Carne și organe - 24 ore.

4. INFIRMAȚII FARMACOLOGICE

4.1 Codul ATCvet: QC01EB02

4.2 Farmacodinamie

Unguent camforat 10% posedă acțiune antiseptică, iritantă locală, analgezică și antiinflamatoare. Mecanismul de acțiune se datorează prezenței în molecula de camfor a unei molecule funcțional active de oxigen care posedă un înalt potențial de oxidare. Unguentul dat, excită terminațiile nervoase a pielii, dilată vasele sangvine și îmbunătățește trofica organelor și țesuturilor.

4.3 Farmacocinetică

Absorbție și acțiune rapidă.

Unguent camforat 10% în funcție de gradul de impact asupra organismului, aparține substanțelor cu pericol redus (clasa de pericol 4 conform GOST 12.1.007-76).

5. INFORMAȚII FARMACEUTICE

5.1 Incompatibilități majore

În lipsa studiilor de compatibilitate, acest medicament de uz veterinar nu trebuie amestecat cu alte medicamente de uz veterinar.

5.2 Termen de valabilitate

Termen de valabilitate al medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

5.3 Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la vederea și îndemina copiilor.

A se păstra în ambalajul original.

A se feri de lumină directă a soarelui.

A se păstra separat de produse alimentare și hrană pentru animale.

A se păstra la $T^{\circ}\text{C}$ de la $+5^{\circ}\text{C}$ până la $+25^{\circ}\text{C}$.

5.4 Naura și compoziția ambalajului primar

Borcane și capace securizate din polimer a câte 17; 40; 130 și 400 g.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

5.5 Precauții special pentru eliminarea medicamentului de uz veterinar neutilizat sau a deșeurilor provenite din utilizarea acestor produse

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu sistemele de colectare aplicabile medicamentului de uz veterinar respectiv.

6. NUMELE DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

AO Uzina” Veterinarnie preparati”, Federația Rusă

7. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

240091

8. DATA PRIMEI ÎNREGISTRĂRI

12/09/2024

**9. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A REZUMATULUI CARACTERISTICILOR
MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR**
09/2024

10. CLASIFICAREA MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
Unguent camforat 10% se eliberează fără prescripție.

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în baza de date a Republicii
Moldova-Registru de Stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).