Anexa nr. 2

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

# PROSPECTUL

## 1. Denumirea medicamentului de uz veterinar

Glucoză 40% soluţie injectabilă

## 2. Compoziţie

**100 ml de medicament conţine (g):**
**Substanţa activă:**
glucoză cristalină - 40,0.

**Excipient:** apă pentru preparate injectabile.

## 3. Specii ţintă

Bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine, câini, pisici.

## 4. Indicaţii de utilizare

Soluţia de glucoză 40% este utilizată în terapia complexă pentru a trata animalele cu forme severe de boli infecţioase acute şi parazitare ale sângelui, insuficienţă cardiovasculară cronică şi tensiune arterială scăzută. Glucoza face parte din soluţiile anti-şoc şi de înlocuire a sângelui, care sunt prescrise animalelor în stare de şoc, colaps sau cu pierderi mari de sânge. Soluţia de glucoză 40% este utilizată la animale în caz de infecţii toxice, otrăviri cu medicamente, monoxid de carbon, mercur, arsen, acid cianhidric şi alte substanţe, edem pulmonar, boli hepatice (hepatită, ciroză), scăderea diurezei. Se prescrie în cazul bolilor ale tractului digestiv cu manifestări de intoxicaţie şi crampe musculare, hipotonie şi atonie a prestomacelor la rumegătoare, cetoză, hemoglobinurie postpartum şi toxemie la vaci lactante, cetonurie la ovine, hemoragii gastrointestinale, pulmonare şi alte sângerări interne (ca remediu hemostatic), diateza hemoragică, iar pentru animalele slabe şi epuizate, ca remediu energetic şi supliment alimentar.

## 5. Contraindicaţii

Hiperglicemie, diabet zaharat, traumatismul cranio-cerebral sever, afectare acută vasculară cerebrală.

## 6. Atenţionări speciale

Atenţionări speciale
Nu există.

Precauţii speciale pentru utilizarea în siguranţă la speciile ţintă:
Medicamentul se administrează intravenos lent, încălzit la temperatura corpului.

Precauţii speciale care vor fi luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:
Când lucraţi cu soluţie glucoză 40% injectabilă , trebuie să respectaţi regulile generale de igienă personală şi măsurile de siguranţă prevăzute atunci când lucraţi cu medicamente de uz veterinar.
Respectaţi regulile de asepsie şi tehnicile de fixare sigură a animalelor.

Precauţii speciale pentru protecţia mediului:
Nu este cazul.

Utilizarea în timpul gestaţiei, lactaţiei sau a ouatului:
Nu există restricţii.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Interacţiunea cu alte medicamente de uz veterinar şi alte forme de interacţiune:
Glucoza este un agent oxidant, de aceea nu se administrează în aceeaşi seringă cu hexametilentetramină, soluţii alcaline, anestezice generale, hipnotice şi soluţii alcaloide.
Glucoza slăbeşte efectul analgezicelor, inactivează streptomicina, reduce eficacitatea nistatinei, prelungeşte efectul adrenalinei şi penicilinei.

Supradozare:
În caz de supradozaj, poate apărea comă hiperglicemică.

Incompatibilităţi majore:
Glucoza slăbeşte efectul analgezicelor, inactivează streptomicina şi reduce eficacitatea nistatinei.
Nu se va administra în aceeaşi seringă cu hexametilentetramină, soluţii alcaline, anestezice generale, hipnotice şi soluţii alcaloide.

## 7. Evenimente adverse
Nu sunt date.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranţei unui produs. Dacă observaţi orice reacţii adverse, chiar şi cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeţi că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactaţi în mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteţi raporta evenimente adverse către deţinătorul certificatului de înregistrare sau reprezentantul local al deţinătorului certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârşitul acestui prospect sau prin sistemul naţional de raportare: mvnotificare@ansa.gov.md, tel. 022-210-156.

## 8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare şi metode de administrare
Medicamentul se administrează intravenos de 1-2 ori pe zi, în calcul pe 1 animal, în doze (ml):
bovine 150 - 370;
viţei 100-150;
cabaline 100-300;
mînji 100-150;
porcine 40-60;
ovine, caprine 50-70;
câini 20-30;
pisici 5-10.

## 9. Recomandări privind administrarea corectă
Medicamentul se administrează intravenos lent, încălzit la temperatura corpului.
Nu utilizaţi soluţie glucoză 40% al medicamentului de uz veterinar dacă observaţi descrierea semnelor vizibile de deteriorare.

## 10. Perioade de aşteptare
Carne şi lapte: zero zile.

## 11. Precauţii speciale pentru depozitare
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.
A se păstra în loc uscat.
A se feri de lumină.
A se păstra la temperatură de la 0°C până la 25°C.
Nu utilizaţi acest medicament de uz veterinar după data expirării marcată pe etichetă după Exp

## 12. Precauţii speciale pentru eliminare
Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deşeurile menajere.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Utilizaţi sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deşeurilor provenite din acestea, în conformitate cu legislaţia naţională şi cu sistemele de colectare aplicabile medicamentului de uz veterinar respectiv.
Solicitaţi medicului veterinar sau farmacistului informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

## 13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar

Se eliberează fără prescripţie veterinară

## 14. Numerele certificatelor de înregistrare şi dimensiunile ambalajelor

250012

Flacoane de sticlă de 50, 100, 200, 400 şi 500 ml.
Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

## 15. Data ultimei revizuiri a prospectului

03/2025

Informaţii detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar (https://registru.ansa.gov.md/).

## 16. Date de contact

Deţinătorul certificatului de înregistrare şi producătorul responsabil pentru eliberarea seriei şi date de contact pentru raportarea reacţiilor adverse suspectate:
Întreprindere Individuală „O.L.KAR-AgroZooVet-Service"
Sf. Gheroev Maidan (Lenin), 272V, Shargorod, regiunea Vinnitsa, Ucraina, 23500 tel.: (043) 442-12-54, fax: (043) 442-17-87, e-mail: vet@olkar.com.ua, www.agroolkar.com.ua

Reprezentanţi locali şi date de contact pentru raportarea reacţiilor adverse suspectate:

Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului certificatului de înregistrare.

**Republica Moldova**
Republica Moldova
SA "Farmavet", Chişinău, Petricani 198.
Tel.: 022 - 31-72-70; 022-31-72-67; 022- 99-9289;
Fax: 022-31-72-68; www.farmavet.md
E-mail: farmavet2017@gmail.com

## 17. Alte informaţii

Codul ATCvet: QB05