Anexa nr. 1

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Glucoză 40% soluţie injectabilă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

100 ml de medicament conţine (g):
Substanţa activă:
glucoză cristalină - 40,0.

Excipient: apă pentru preparate injectabile.

3. INFORMAŢII CLINICE

3.1 Specii ţintă
Bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine, câini, pisici.

3.2 Indicaţii de utilizare pentru fiecare specie ţintă
Soluţia de glucoză 40% este utilizată în terapia complexă pentru a trata animalele cu forme severe de boli infecţioase acute şi parazitare ale sângelui, insuficienţă cardiovasculară cronică şi tensiune arterială scăzută. Glucoza face parte din soluţiile anti-şoc şi de înlocuire a sângelui, care sunt prescrise animalelor în stare de şoc, colaps sau cu pierderi mari de sânge. Soluţia de glucoză 40% este utilizată la animale în caz de infecţii toxice, otrăviri cu medicamente, monoxid de carbon, mercur, arsen, acid cianhidric şi alte substanţe, edem pulmonar, boli hepatice (hepatită, ciroză), scăderea diurezei. Se prescrie în cazul bolilor ale tractului digestiv cu manifestări de intoxicaţie şi crampe musculare, hipotonie şi atonie a prestomacelor la rumegătoare, cetoză, hemoglobinurie postpartum şi toxemie la vaci lactante, cetonurie la ovine, hemoragii gastrointestinale, pulmonare şi alte sângerări interne (ca remediu hemostatic), diateza hemoragică, iar pentru animalele slabe şi epuizate, ca remediu energetic şi supliment alimentar.

3.3 Contraindicaţii
Hiperglicemie, diabet zaharat, traumatismul cranio-cerebral sever, afectare acută vasculară cerebrală.

3.4 Atenţionări speciale
Nu există.

3.5 Precauţii speciale pentru utilizare

Precauţii speciale pentru utilizarea în siguranţă la speciile ţintă:
Medicamentul se administrează intravenos lent, încălzit la temperatura corpului.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:
Când lucraţi cu soluţie glucoză 40% injectabilă , trebuie să respectaţi regulile generale de igienă personală şi măsurile de siguranţă prevăzute atunci când lucraţi cu medicamente de uz veterinar.
Respectaţi regulile de asepsie şi tehnicile de fixare sigură a animalelor.

Precauţii speciale pentru protecţia mediului:
Nu este cazul.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

3.6 Evenimente adverse
Nu sunt date.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranţei medicamentului de uz veterinar. Rapoartele se trimit, de preferinţă prin medicul veterinar, fie deţinătorului certificatului de înregistrare sau reprezentantului local al acestuia, fie Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor prin sistemul naţional de raportare. Consultaţi, de asemenea, secţiunea 16 din prospect pentru datele de contact respective.

3.7 Utilizarea în timpul gestaţiei, lactaţiei sau a ouatului
Nu există restricţii.

3.8 Interacţiunea cu alte medicamente de uz veterinar şi alte forme de interacţiune
Glucoza este un agent oxidant, de aceea nu se administrează în aceeaşi seringă cu hexametilentetramină, soluţii alcaline, anestezice generale, hipnotice şi soluţii alcaloide.
Glucoza slăbeşte efectul analgezicelor, inactivează streptomicina, reduce eficacitatea nistatinei, prelungeşte efectul adrenalinei şi penicilinei.

3.9 Căi de administrare şi doze
Medicamentul se administrează intravenos de 1-2 ori pe zi, în calcul pe 1 animal, în doze (ml):
bovine 150 - 370;
viţei 100-150;
cabaline 100-300;
mînji 100-150;
porcine 40-60;
ovine, caprine 50-70;
câini 20-30;
pisici 5-10.

3.10 Simptome de supradozaj (şi, după caz, proceduri de urgenţă şi antidoturi)
În caz de supradozaj, poate apărea comă hiperglicemică.

3.11 Restricţii speciale de utilizare şi condiţii speciale de utilizare, inclusiv restricţii privind utilizarea medicamentelor de uz veterinar antimicrobiene şi antiparazitare, pentru a limita riscul de dezvoltare a rezistenţei
Nu este cazul.

3.12 Perioade de aşteptare
Carne şi lapte: zero zile.

4. INFORMAŢII FARMACOLOGICE IMUNOLOGICE

4.1 Codul ATCvet: QB05

4.2 Farmacodinamie
O soluţie hipertonică de glucoză cu 40% creşte presiunea osmotică a sângelui, îmbunătăţeşte procesele metabolice, funcţia antitoxică hepatică şi funcţia cardiacă, dilată vasele sangvine şi creşte diureza. Glucoza stimulează sinteza hormonilor şi enzimelor, creşte apărarea organismului animalului. Când se administrează o soluţie hipertonică de glucoză, procesele oxido – reducere sunt intensificate şi este activată depunerea de glicogen în ficat. O soluţie de glucoză 40% are proprietăţi antitoxice pronunţate şi accelerează eliminarea lor din organism.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

4.3 Farmacocinetică

În urma administrării intravenoase, glucoza este distribuită în spaţiul intravascular şi apoi este preluată în spaţiul inracelular. Produsele finale ale oxidării complete a glucozei sunt eliminate prin plămâni (dioxidul de carbon) şi prin rinichi (apa). La animalele sănătoase nu se excretă glucoza prin rinichi. În condiţii metabolice patologice (de ex. diabet zaharat, post- traumatic) asociate cu hiperglicemie glucoza este excretată şi renal (glucozurie), când este depăşită capacitatea maximă de reabsorbţie tubulară.

Proprietăţi de mediu
Nu este cazul.

5. INFORMAŢII FARMACEUTICE

5.1 Incompatibilităţi majore

Glucoza slăbeşte efectul analgezicelor, inactivează streptomicina şi reduce eficacitatea nistatinei.
Nu se va administra în aceeaşi seringă cu hexametilentetramină, soluţii alcaline, anestezice generale, hipnotice şi soluţii alcaloide.

5.2 Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate al medicamentului de uz veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

5.3 Precauţii speciale pentru depozitare

A se păstra în loc uscat.
A se feri de lumină.
A se păstra la temperatură de la 0°C până la 25°C.

5.4 Natura şi compoziţia ambalajului primar

Flacoane de sticlă de 50, 100, 200, 400 şi 500 ml.
Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

5.5 Precauţii speciale pentru eliminarea medicamentului de uz veterinar neutilizate sau a deşeurilor provenite din utilizarea acestor produse

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deşeurile menajere.
Utilizaţi sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deşeurilor provenite din acestea, în conformitate cu legislaţia naţională şi cu sistemele de colectare aplicabile medicamentului de uz veterinar respectiv.

6. NUMELE DEŢINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

Întreprindere Individuală „O.L.KAR-AgroZooVet-Service”
Sf. Gheroev Maidan (Lenin), 272V, Shargorod, regiunea Vinnitsa, Ucraina, 23500
tel.: (043) 442-12-54, fax: (043) 442-17-87, e-mail: vet@olkar.com.ua, www.agroolkar.com.ua

7. NUMĂRUL(NUMERELE) CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

250012

8. DATA PRIMEI ÎNREGISTRĂRI

19/03/2025

9. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A REZUMATULUI CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

03/2025

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

10. CLASIFICAREA MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR

Medicament de uz veterinar care se eliberează fără prescripţie.

Informaţii detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de stat al medicamentelor de uz veterinar (https://registru.ansa.gov.md/).