Anexa nr. 2

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

DIAZINON 60% EC

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament de uz veterinar deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect.
- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane, care îl pot utiliza greşit.

1. DENUMIREA ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ŞI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

SHANDONG LUXI ANIMAL MEDICINE SHARE CO., LTD CHINA,
Shandong Province, China tel.: 865342161518, fax: 865342151586,
www.luxiam.com; email: dly0918@126.com

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAŢIA ŞI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

100 ml concentrat emulsionabil conţine:

Substanţă activă:

Diazinon - 60 g

Lista excipienţilor:

Emulgator dodecil benzen sulfonate de calciu, solvent aromatic.

3. INDICAŢII TERAPEUTICE

Diazinon 60% - concentrat emulsionabil de uz extern, se recomandă pentru controlul şi tratamentul scabiei (sarcoptică, psoroptică, corioptică) şi a ectoparazitismului produs de căpuşe, păduchi malofagi şi hematofagi, purici şi alte insecte la bovine, ovine şi caprine:

- Căpuşi acariforme *(familia Psoroptidae, Sarcoptidae, Cheyletydae);*
- Căpuşi trimbidiforme *(familia Dermodecidae);*
- Căpuşi parazitiforme *(familia Ixodidae, Argasidae, Dermanyssidae)*
- Păduchi *(Melophagus ovinus);*
- Insecte hematofage *(familia Muscidae,Culicidae, Simuliidae, Ceratopoginidae, Tabanidae, Psyhodidae);*
- Larvele de tăuni a VMC *(Hipoderma bovis, H. Lineatum)* şi a ovinelor *(Oestrus ovis);*
- Larvele şi fazele adulte de muşte *(familia Calliphoridae, Sarcophagidae)*

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

4. CONTRAINDICAŢII

Nu se administrează la animalele cu hipersensibilitate cunoscută la substanta activă sau la oricare dintre excipienţi.
Nu se tratează animalele bolnave, slabe, epuizate sau însetate.
Nu se administrează la animalele cu leziuni cutanate.
Nu se efectuează tratament cu DIAZINON 60% la păsări şi pisici.
Animalele nu se tratează cu DIAZINON 60% pe vreme umedă sau foarte caldă.

5. REACŢII ADVERSE

În timpul tratamentului cu DIAZINON pot apărea ocazional iritaţii ale pielii, mâncărimi, pielea poate deveni uscată sau pot apărea crăpături ale pielii.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.

6. SPECII ŢINTĂ

Bovine, ovine şi caprine.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ŞI DOZA PRESCRISĂ

Medicamentul se administrează numai extern, sub formă de tratamente locale, pulverizări sau îmbăieri.
Durata şi frecvenţa aplicării tratamentului depind de natura parazitului, condiţiile climaterice şi gradul de infestare.
Tratamentul antiparazitar se repetă la un interval de 10 – 14 zile în funcţie de specia parazitului şi gradul de infestare.
Soluţiile se prepară şi se utilizează în aceeaşi zi.
<u>Bovine:</u>
Pulverizare: 1L de Diazinon 60% EC la 1000 L de apă; 1:1000, (600 ppm s.a.).
Stropirea animalului se face pe toate părţile corpului.
Completare: 1L de Diazinon 60% EC la 400 L de apă; 1:400 (1500 ppm s.a.).
Tratamente locale: 5 ml Diazinon 60%/ /1 litru apă, diluţie 1:200, (3000 ppm s.a.).
<u>Ovine – caprine:</u>
Baia iniţială:10 ml Diazinon 60% la 24 L apă, adică 1:2400 (250 ppm s.a.)
Completarea: 25 ml Diazonon 60% la 20 L apă, adică 1:800 (750 ppm s.a.)
Tratament local: 5 ml Diazinon 60%/ / 1 litru apă, diluţie 1:200 (3000 ppm s.a.).
Pulverizare: 20 ml Diazinon 60% / 20 litri apă, diluţie 1:1000 (600 ppm s.a.).

Pentru îmbăire este necesar ca înălţimea soluţiei în baie să fie de 70 cm pentru miei şi tineret şi 100 cm pentru oi adulte. Este importantă menţinerea concentraţiei soluţiei pentru îmbăierea în momentul când nivelul acesteia a scăzut cu 10%. Animalele trebuie imersate complet cel puţin o dată. Animalele se prelucrează pe teren special amenajat, dotat cu scurgere.
Utilizarea la adăposturile de animale: 200 ml Diazinon 60% în 5 L de apă pentru 100 m^2, care reprezintă concentraţia de 1:25.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

8. PERIOADA DE AŞTEPTARE

Carne şi laptele de bovine - 18 zile
Carne şi laptele de ovine, caprine - 21 de zile

9. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.
A se păstra la temperatură mai mică de 25° C.
A se proteja de lumina directă, surse de căldură, foc şi bine ventilat.
A se păstra în ambalajul original, bine închis.
A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.
DIAZINON CONCENTRAT ESTE INFLAMABIL!

10. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Diazinon 60% EC - concentrat emulsionabil nu trebuie să fie deversat în cursuri de apă, datorită pericolului pentru peşti şi alte organisme acvatice.
Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.
Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

11. ATENŢIONĂRI SPECIALE

Atenţionări speciale pentru fiecare specie-ţintă:
Nu se aplică tratamentul cu DIAZINON 60% la tineretul bovin sub 6 săptămâni.
Nu se îmbăiază oile în primele 14 zile după tundere, animalele slăbite şi gestante, însetate sau cu plăgi provocate de tuns şi nevindecate.
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Soluţia de îmbăiere se utilizează doar în ziua preparării după care se goleşte baia şi se spală bine.
Nu se vor adăuga la soluţia de îmbăiere, sulfat de cupru sau alţi agenţi de umectare.
A se spăla ugerul animalelor lactante după îmbăiere.
În cazul în care este necesar să se îmbăieze oile sau caprele gestante, acestea vor fi introduse cu grijă în baie şi vor fi ţinute sub observaţie.
Dacă în interval de 24 de ore după tratament sunt ploi puternice, se poate repeta operaţiunea.
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:
Se va evita contactul direct atât cu medicamentul concentrat cât şi cu soluţia diluată.
A se purta echipament de protecţie corespunzător.
Nociv prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire.
A se evita contactul cu pielea şi ochii. În caz de contact cu ochii, se spală imediat cu apă şi se consultă medicul.
A nu se fuma, bea sau mînca în timpul administrării medicamentului.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Spălaţi bine mâinile după administrarea produsului.
A se păstra departe de alimente, băuturi şi hrana pentru animale.
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la unul dintre componentele medicamentului trebuie sa evite contactul cu acesta.
În caz de ingerare accidentală a medicamentului sau alergii provocate de contactul acestuia cu pielea solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi prospectul meicamentului sau eticheta.

Utilizare în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat:

Nu au fost raportate efecte nedorite în urma tratamentului cu DIAZINON 60% aplicat animalelor gestante sau în lactaţie.
Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar responsabil.

Interacţiuni cu alte medicamente de uz veterinar şi alte forme de interacţiune

Nu se vor face simultan tratamente cu diazinon şi levamisol şi alţi compuşi organofosforici şi nici în următoarele 14 zile de la aplicarea tratamentului.
Nu se asociază soluţiile pe bază de diazinon, cu substanţe incompatibile ca sulfatul de cupru şi soluţiile acestuia, cu agenţi oxidanţi puternici sau cu acizi tari.

Supradozare

În cazul unei supradozări accidentale pot apărea iritaţii ale pielii, mâncărimi, stări de ameţeală, toropeală. În asemenea situaţii se recomandă scoaterea animalului la aer curat, spălarea pielii cu multă apă şi săpun, iar în cazul în care simptomele persistă trebuie cerut sfatul medicului veterinar.

Incompatibilităţi:

Substanţa activă - diazinon este incompatibilă cu sulfatul de cupru şi cu soluţiile acestuia, cu agenţii oxidanţi puternici şi cu acizii tari.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a medicamentului de uz veterinar aşa cum este ambalat pentru comercializare: 24 luni.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 12 luni.
Perioadă de valabilitate după diluare conform indicaţiilor: 24 ore.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripţiei veterinare.

14. NATURA ŞI COMPOZIŢIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacoane din sticlă închisă la culoare, cu un volum de 10 ml, 20 ml, 50 ml închise cu dopuri de cauciuc şi capsulă din aluminiu şi flacoane din polimer 100 ml, 250 ml, 500 ml şi 1000 ml.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

06.2025