

PROSPECTUL

1. Denumirea medicamentului de uz veterinar

CEVAC BROILER ND K, emulsie injectabilă pentru găini

2. Compoziție

Fiecare doză de vaccin conține:

Substanța activă:

Virusul inactivat al bolii de Newcastle, tulpina NDV – “SZ” LaSota - Induce minim 5 log₂ HI¹ sau minim 50 PD₅₀²

¹ – Inhibarea hemaglutinării

² – Doze protectoare 50% conform Ph Eur 0870

Adjuvant(adjuvanți):

Adjuvant uleios max. 0,075 ml

3. Specii țintă

Găină (pui de găină).

4. Indicații de utilizare

Vaccinul este recomandat pentru vaccinarea puilor de găină, în special a puilor de o zi, împotriva bolii de Newcastle (pseudopestei aviare – PPA).

Cevac Broiler ND K poate fi utilizat singur sau după un vaccin viu împotriva bolii de Newcastle, pentru a întări imunizarea indusă de acesta, în cazul unei presiuni infecțioase mari.

Instalarea imunității: 3 săptămâni de la vaccinare.

Durata imunității: minim 11 săptămâni.

5. Contraindicații

Nu există.

6. Atenționări speciale

Atenționări speciale:

Nu există.

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

O protecție satisfăcătoare poate fi dobândită numai pe efective sănătoase, bine dezvoltate.

Odată flaconul deschis, conținutul trebuie folosit imediat, altfel trebuie distrus.

Respectați condițiile de asepsie locală.

Precauții speciale care vor fi luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În cazul de auto-injecție accidentală, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul vaccinului sau eticheta.

Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu există informații privind siguranța și eficacitatea vaccinului când este utilizat cu alte medicamente de uz veterinar. Decizia utilizării acestui vaccin înainte sau după alte medicamente de uz veterinar va fi stabilită de la caz la caz.

Incompatibilități majore:

În lipsa studiilor de compatibilitate, acest medicament de uz veterinar nu trebuie amestecat cu alte medicamente de uz veterinar.

7. Evenimente adverse

Pui de găină

Foarte rare (<1 animal / 10 000 de animale tratate, inclusiv raportările izolate):	Umflături la locul injectării ¹ , eriteme la locul injectării.
---	---

¹ De dimensiunea unui bob de mac, dispar în majoritatea cazurilor în 2-3 săptămâni.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactați în mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimente adverse către deținătorul certificatului de înregistrare sau reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: mvnnotificare@ansa.gov.md, tel. 022-210-156.

8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare

Injectii subcutanate (în zona cervicală) sau intramusculare (în musculatura coapsei).
Doza vaccinală este de 0,1 ml pe pasăre.

9. Recomandări privind administrarea corectă

Agitați bine flaconul înainte și în timpul utilizării.
Utilizați numai echipament de injectare steril.
Aduceți vaccinul la temperatura camerei (15-25 °C) cu 3-4 ore înainte de utilizare.
Verificați dacă seringă automată distribuie doza corectă la o administrare.

10. Perioade de așteptare

Zero zile.

11. Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.
A se păstra la frigider (2 °C - 8 °C).
A se feri de îngheț.
A se feri de lumină.
Nu utilizați acest medicament de uz veterinar după data expirării marcată pe etichetă și cutie de carton după Exp. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.
Termenul de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: imediat.

12. Precauții speciale pentru eliminare

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile. Aceste măsuri ar trebui să contribuie la protecția mediului.

Solicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar

Medicament de uz veterinar care se eliberează cu prescripție.

14. Numerele certificatelor de înregistrare și dimensiunile ambalajelor

230071

Dimensiunea ambalajului:

1 x 100 ml

1 x 500 ml

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

15. Data ultimei revizuirii a prospectului

06/2025

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).

16. Date de contact

Deținătorul certificatului de înregistrare și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

CEVA SANTE ANIMALE ROMANIA,
Str. Chindiei 5, sector 4, Bucharest, România
Tel: +800 35 22 11 51

Producător responsabil pentru eliberarea seriei:

CEVA-PHYLAXIA VETERINARY BIOLOGICALS CO. LTD.
1105 Budapest, Szállás u.5., Ungaria

Reprezentanți locali și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

Republica Moldova

SRL Sumagrovat Prim,
mun. Chișinău, str. Muncești 293 B,
e-mail: info@sumagro.md, tel. 079458824

17. Alte informații

Codul ATCvet: QI01AA02

Vaccinul este recomandat pentru imunizarea activă a puilor de găină, în special a puilor de o zi, împotriva bolii de Newcastle (Pseudopesta aviară).

Cevac Broiler ND K poate fi utilizat singur sau împreună cu un vaccin viu împotriva bolii de Newcastle.

Indicația vaccinului este de prevenire a bolii de Newcastle.

