

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Gallimune SE+ST, emulsie pentru injecție

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Fiecare doză de 0,3 ml de vaccin conține:

Substanțe active:

Salmonella Enteritidis PT4 inactivată, cel puțin.....142 unități mOD*

Salmonella Typhimurium DT 104 inactivată, cel puțin71 unități mOD*

Adjuvant:

Ulei de parafinăq.s. 0.3 ml

Excipient:

Tiomersal, cel mult30 µg

*unități mOD: cantitatea de bacterii, măsurată prin densitate optică la 562 nm după inactivare

Pentru lista completă a excipienților, vezi secțiunea 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Emulsie pentru injecție.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii-țintă:

Pui de găină (rase de reproducție și găini ouătoare).

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor-țintă

Imunizarea activă a tineretului de reproducție și găini ouătoare:

- Pentru a reduce re izolarea Salmonella Enteritidis la nivelul organelor genitale și a tractului intestinal, asigurând astfel evitarea contaminării cojii ouălor și a contaminării transovariene a ouălor.

- Pentru a reduce re izolarea Salmonella Typhimurium la nivelul tractului intestinal asigurând astfel evitarea contaminării cojii ouălor.

Imunitatea a fost demonstrată prin infecție de control. Imunitatea se instalează la 4 săptămâni după vaccinare și persistă până la sfârșitul perioadei de ouat.

4.3 Contraindicații:

Vezi secțiunea 4.7 „, Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat”.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Nu există.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

4.5.1 Precauții speciale pentru utilizare la animale:

A se vaccina numai animalele sănătoase.

4.5.2 Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Pentru utilizator:

Acest vaccin conține ulei mineral. Auto-injectarea/injectarea accidentală poate provoca dureri puternice și inflamații, în special dacă injectarea se face în articulație sau în deget, iar în cazuri rare poate duce la pierderea degetului afectat, dacă nu sunt acordate îngrijiri medicale imediat.

În cazul unei injectări accidentale cu acest vaccin, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul vaccinului, chiar dacă a fost injectată o cantitate redusă de vaccin.

Dacă durerea persistă, mai mult de 12 ore după examinarea medicală, solicitați din nou sfatul medicului.

Pentru medic:

Acest vaccin conține ulei mineral. Chiar dacă au fost injectate cantități mici de vaccin, injectarea accidentală cu acest vaccin poate provoca inflamație accentuată, care poate conduce, de exemplu, la necroză ischemică și chiar pierderea unui deget. Este necesară intervenția chirurgicală imediată, calificată, care poate necesita o incizie imediată și spălarea zonei injectate, în special în cazul în care este implicată pulpa degetului sau tendonul.

4.6 Reacții adverse

Vaccinarea poate determina o reacție inflamatorie la locul injectării.

O ușoară întârziere la intrarea în ouat poate fi observată, dar fără impact asupra vârfului producției sau a productivității în general.

4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

A nu se utiliza cu 2 săptămâni înainte de intrarea în ouat sau în timpul perioadei de ouat.

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Sunt disponibile date privind siguranța și eficacitatea care demonstrează că acest vaccin poate fi administrat în aceeași zi dar nu mixat cu vaccinurile inactivate pentru găini de la Boehringer, respectiv gama Gallimune împotriva Sindromului Căderii Ouatului (EDS76), a bolii de Newcastle, a Bronșitei Infecțioase (Mass41) și a Rinotraheitei aviare (Sindromul capului umflat).

Nu există informații disponibile referitoare la siguranța și eficacitatea acestui vaccin când este utilizat cu alt medicament de uz veterinar, cu excepția celor mai sus menționate. Decizia utilizării acestui vaccin înainte sau după oricare alt medicament de uz veterinar va fi stabilită de la caz la caz.

4.9 Doză și calea de administrare

Se administrează o doză de vaccin (0.3 ml) pe cale intramisculară sau subcutanată, conform cu următoarea schemă de vaccinare:

- Prima injecție: de la vârsta de 6 săptămâni;
- A doua injecție: la vârsta de 16 săptămâni.

Intervalul de timp între 2 administrări este de cel puțin 4 săptămâni.

A se agita înainte de utilizare.

A se aplica procedurile aseptice obișnuite.

A nu se utiliza seringi din cauciuc natural sau pistoane de butil elastomer.

Echipamentul de vaccinare, inclusiv acele și seringile trebuie să fie sterilizate înainte de utilizare.

4.10 Supradozare

Nu au fost observate alte efecte adverse după administrarea unei supradoze de vaccin în afara celor menționate la paragraful 4.6 "Reacții adverse"

4.11 Perioada de așteptare:

Zero zile

5. PROPRIETĂȚI IMUNOLOGICE

Vaccin inactivat cu adjuvant uleios împotriva *Salmonella* Enteritidis și *Salmonella* Typhimurium
Vaccinul stimulează imunitatea activă a tineretului de reproducție și găini ouătoare împotriva *Salmonella* Enteritidis și *Salmonella* Typhimurium.

Tulpina SE este clasificată ca fagotip 4, iar tulpina ST este clasificată ca tipul Definitiv DT 104.

ATCvet cod: QI01AB01

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților:

Ulei de parafină

Esteri ai acizilor grași și ai poliolilor

Tiomersal

Esteri ai acizilor grași și ai poliolilor etoxilați.

Apă pentru injecții

6.2 Incompatibilități:

A nu se amesteca cu nici un alt medicament de uz veterinar.

6.3 Perioada de valabilitate:

Perioada de valabilitate a medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare:

18 luni

Perioada de valabilitate după deschiderea ambalajului primar: a se utiliza imediat după deschidere.

6.4 Condiții speciale pentru depozitare:

A se păstra în condiții de refrigerare (2°C - 8°C), protejât de lumină.. A nu se congela.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar

Natura elementelor de ambalare primară:

-Flacon din polipropilenă.

-Închidere cu cauciuc nitril derivat elastomer

-Capsă de aluminiu

Ambalare pentru comercializare:

Flacon de 300 ml (1000 de doze)

6.6 Măsurile speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar neutralizate, sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A.

Addressa: Via Giovanni Lorerizini b,

20139 Milano

Italia

8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

190015

9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE (sau data reînnoirii certificatului de înregistrare)

10.07.2019

10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

Martie 2019