Anexa nr. 2

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

PROSPECTUL

1. Denumirea medicamentului de uz veterinar
Dana[R] Ultra spray.

2. Compoziţie
1ml conţine:
Substanţa activă:
Fipronil - 5 mg,
Ciflutrin - 0,5 mg

Excipienţi:

Compoziţia calitativă a excipienţilor a altor constituenţi
Acid citric
Glicerol
Polietilenglicol-400
Parfum" Vanilla"
Apă purificată
Alcool izopropilic

Soluţie transparentă, la culoare de la incoloră până la galben-pal.

3. Specii ţintă
Câini, pisici.

4. Indicaţii de utilizare
Dana[R] Ultra spray se indică câinilor şi pisicilor în tratamentul şi profilaxia entomozelor provocate de purici, păduchi malofagi şi hematofagi, în combaterea căpuşelor ixode şi insectelor diptere.

5. Contraindicaţii
Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.
Nu se utilizează la animalele slăbite, caşectice, bolnave de boli infecţioase, în perioada de convalescenţă şi tineretului sub 10 săptămîni.

6. Atenţionări speciale

Atenţionări speciale
Nu este indicat animalelor productive.

Precauţii speciale pentru utilizare
Precauţii speciael pentru utilizarea în siguranţă la speciile ţintă
A se aplica cu precauţie pe suprafaţă umedă sau afectată.

Prima utilizare a medicamentului dat poate provoca o uşoară agitaţie sau deprimare, lăcrimare sau salivaţie care trece de la sine.

Până când blana nu este uscată complet, nu trebuie de lăsat animalele în apropierea focurilor deschise sau a dispozitivelor de încălzire, spălate şi scăldate timp de 48 de ore după tratament,. De asemenea, de evitat contactul animalului cu lumina directă a soarelui imediat după tratament.
La prima utilizare a medicamentului, în cazuri rare, poate apărea o uşoară agitaţie sau deprimare, lăcrimare sau salivaţie care trece de la sine.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Se recomandă respectarea dozajului indicat şi a modului de administrare pentru a nu diminua eficienţa terapeutică. În caz de omitere a unei sau mai multor administrări, utilizarea se reia în aceeaşi doză, conform aceeaşi scheme.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:
În timpul lucrului cu Dana^{R} Ultra spray e important de respectat regulile comune de igienă personală şi a tehnicii securităţii prevăzute în lucru cu medicamentele de uz veterinar.
Persoanelor cu hipesensibilitate la componentele medicamentului de uz veterinar se recomandă evitarea contactului direct cu acesta.
În caz de contact accidental cu pielea sau tunicile mucoase oculare, ele se spală din abundenţă cu apă.
În caz de îngerare sau apariţie a reacţiilor alergice e necesar de adresat la o instituţie medicală (cu sine de avut eticheta sau prospectul de utilizare).

Precauţii speciale pentru protecţia mediului:
Acest medicament de uz veterinar nu trebuie să ajungă în cursurile de apă, deoarece substanţele active pot fi periculoase pentru peşti şi alte organisme acvatice.

Utilizare în timpul gestaţiei, lactaţiei sau a ouatului
Nu se utilizează în perioada de gestaţie şi lactaţie

Interacţiunea cu alte medicamente de uz veterinar şi alte forme de interacţiune
A nu se folosi concomitent cu alte medicamente inscetoacaricide.

Supradozare
Supradozare poate provoca salivaţie abundentă, tremor muscular, vomă. În astfel de cazuri suprafaţa tratată se spală cu apă şi săpun pentru înlăturarea medicamentului.

Restricţii speciale de utilizare şi condiţii speciale de utilizare, inclusiv restricţii privind utilizarea medicamentelor de uz veterinar antimicrobiene şi antiparazitare, pentru a limita riscul de dezvoltare a rezistenţei
Nu este cazul.

Incompatibilităţi majore
A nu se amesteca cu nici un alt insectoacaricid.

7. Evenimente adverse
Reacţii adverse sau complicaţii în urma administrării conform prospectului dat nu apar. În caz de sensibilitate sporită la componentele medicamentului şi apariţie a reacţiilor adverse şi a complicaţiilor, medicamentul se spală de pe suprafaţa tratată cu apă şi săpun, la necessitate se aplică terapie desensibilizantă.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranţei unui produs. Dacă observaţi orice reacţii adverse, chiar şi cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect , sau credeţi că medicamentul a avut efect, vă rugăm să contactaţi în mai întîi medicul veterinar. De asemenea, puteţi raporta evenimente adverse către deţinătorul certificatului de înregistrare sau reprezentantul local al deţinătorului certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfîrşitul acestui prospect de la sfîrşitul acestul prospect sau prin sistemul naţional de raportare: mvnotificare@ansa.gov.md, tel.: 022-210-156.

8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare şi metode de administrare
Înainte de tratament flaconul se agită bine şi, ţinîndu-l vertical, se aspersează pe suprafaţa tratată de la distanţa de 10-20 cm.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Dana[R] Ultra spray se aspersează împotriva direcţiei creşterii blănii până la umectarea uşoară a ei, la animalele cu blană lungă, smocul se ţine cu mâina şi se aplică la rădăcina părului şi pe piele.
Acoperind ochii animalului se tratează pavilioanele urechilor şi gâtul.

Doza medicamentului, în dependenţă de greutatea animalului şi starea blănii, este de 1-2 ml/1 kg greutatea corporală (2-4 apăsări pe difuzor).
Pentru prevenirea reinfestării a se prelucra aşternuturile şi alte articole de îngrijire a animalelor în raport de 2 ml (4 apăsări pe difuzor) /1m^2 de suprafaţă prelucrată.
Timp de 3 zile a nu se permite contactul direct cu suprafeţele prelucrate şi înainte de folosire ulterioară ele se spală cu detergent.
Pentru combaterea căpuşelor ixode de pe suprafaţa corpului, Dana[R] Ultra spray se aplică pe căpuşă şi locul fixării ei de corpul animalului (1 apăsare pe difuzor). Dacă timp de 20-30 min. căpuşa nu cade singură, atunci cu grijă se indeparteaza cu o pensetă şi se nimiceşte.

9. Recomandări privind administrarea corectă
Tratamentul se efecteează la aer liber sau într-o încăpere bine ventilată cu geamurile deschise, ferit de focul deschis.
Pentru evitarea lingerii şi îngerării medicamentului, animalului i se îmbracă botniţă sau guler de protecţie care se scoate după uscarea totală a animalului.
Tratamente repetate a animalelor contra insectelor şi căpuşelor se fac la indicaţii, dar nu mai frecvent de 1 dată pe lună.

10. Perioade de aşteptare
Nu este cazul.

11. Precauţii speciale pentru depozitare
A nu se lăsa la vederea şi îndemîna copiilor.
A se păstra în ambalajul original, separat de produse alimentare şi hrană pentru animale.
A se feri de lumină directă a soarelui şi flacără deschisă.
A nu se păstra la T^{0}C de la 2^{0}C până la +25^{0}C.
Nu utilizaţi acest medicament de uz veterinar după data expirării marcată pe etichetă după Exp. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective

12. Precauţii speciale pentru eliminare
Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deşeurile menajere.

Utilizaţi sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deşeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerinţele locale şi cu sistemele naţionale de colectare aplicabile. Aceste măsuri ar trebui să contribuie la protecţia mediului.

Solicitaţi medicului veterinar sau farmacistului informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar
Medicament de uz veterinar care se eliberează fără prescripţie.

14. Numerele certificatelor de înregistrare şi dimensiunile ambalajelor
240034

Flacoane din polimer cu difuzor şi capac din plastic, a câte 95 şi 100 ml.
Flaconul este ambulat în cutie din carton şi este însoţit de un prospect de utilizare.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

15. Data ultimei revizuiri a prospectului
07/2025

16. Date de contact

Deținătorul certificatului de înregistrare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:
OOO Apicenna , Federația Rusă
reg. Moscova, or.Balașiha, șos. Poltevskoe 4
+7(495)580-77-13

Reprezentanți locali și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

Republica Moldova
SRL Zoofarmagro,
mun.Chișinău, str.Cameniţa 4a
Tel/fax 373 022 855-071; 373 69827427
www.zoofarmagro@mail.ru

17. Alte informații
Codul ATCvet: QP53AX65
Dana^{R} Ultra spray face parte din grupul substanţelor cu pericol moderat (clasa 3 de pericol, conform GOST 12.1.007-76). În doze recomandate nu posedă acțiune local-iritantă, resorbtiv-toxică și sensibilizantă. În caz de contact accidental tunicile mucoase oculare provoacă o iritare ușoară.
Acest medicament este toxic pentru albini, pești și alți hidrobionți.