Anexa nr. 2

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

PROSPECTUL

1. Denumirea medicamentului de uz veterinar

Borogluconat de calciu soluţie injectabilă

2. Compoziţie

100 ml de medicament conţine (g):
Substanţe active:
Gluconat de calciu - 38,00 g.
Acid boric - 6,50 g.
Clorură de magneziu x $6H_2O$ - 6,00g.
Edetat disodic - 0,05 g
Metabisulfit de sodiu - 0,05g.

Excipient: hidroxid de sodiu ad, apă distilată pentru preparate injectabile pînă la - 100 ml.

Soluţie limpede, incoloră cu nuanţă slab gălbuie, inodoră.

3. Specii ţintă
Bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine, câini, pisici.

4. Indicaţii de utilizare
Borgluconatul de calciu este utilizat pentru prevenirea şi tratamentul animalelor în următoarele boli şi stări patologice: pareze şi paraplegii ante- şi postpartum, hipocalcemie, tetanie, alergii, eclampsia scroafelor şi carnasierelor, tulburări metabolice, rahitism, osteomalacie, acetonurile, stări hemoragice, anemii, animale slăbite, accidente postvaccinale, ateropatii, după distocii, avorturi, prolaps vaginal şi uterin, operaţii cezariene, laparatomii, afecţiuni toxice ale ficatului.

5. Contraindicaţii
Este contraindicată utilizarea Borgluconatului de calciu la animalele cu sensibilitate individuală crescută la componentele medicamentului, hipercalcemie, coagulare crescută a sîngelui, leziuni organice ale rinichilor. A nu se administra la animalele tratate cu digoxine.

6. Atenţionări speciale

Atenţionări speciale:
Nu există.

Precauţii speciale pentru utilizarea în siguranţă la speciile ţintă:
Administrarea medicamentului de uz veterinar pe cale intravenoasă se face lent, numai după ce este adus la temperatura corpului. Injectarea intravenoasă se întrerupe imediat dacă apare vomă, sudoraţii sau tremurături musculare.

Precauţii speciale care vor fi luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:
Cînd lucraţi cu medicamentul Borgluconat de calciu, trebuie să urmaţi regulile generale de igienă personală şi măsurile de siguranţă prevăzute atunci cînd lucraţi cu medicamente de uz veterinar.
Persoanele cu hipersensibilitate la componentele medicamentului trebuie să evite contactul direct cu Borgluconat de calciu.
Nu fumaţi, nu beţi, nu mîncaţi în timpul lucrului.
La sfîrşitul lucrului cu medicamentul, mîinile trebuie spălate cu apă caldă şi săpun. În cazul contactului accidental al medicamentului cu pielea sau mucoasele ochilor, acestea trebuie spălate cu multă apă.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

În cazul reacţiilor alergice sau în cazul ingerării accidentale a medicamentului în corpul uman, trebuie să contactaţi imediat o instituţie medicală (ar trebui să aveţi prospectul de utilizare a medicamentului sau o etichetă cu dvs.).

Precauţii speciale pentru protecţia mediului:
Nu este cazul.

Gestaţie şi lactaţie:
La animalele gestante Borgluconat de calciu se administrează cu precauţie şi sub supravegherea medicului veterinar. Poate fi utilizat în perioada de lactaţie fără restricţii.

Interacţiunea cu alte medicamente de uz veterinar şi alte forme de interacţiune:
Borgluconat de calciu nu se administrează împreună cu digoxina, antacide care conţin calciu sau salicilaţi, sulfaţi (se formează săruri de calciu insolubile sau puţin solubile). Nu se recomandă utilizarea cu antibiotice din grupa tetraciclinei, deoarece medicamentul formează compuşi insolubili cu acestea (ceea ce duce la o scădere a eficacităţii). În timpul tratamentului cu glicozide cardiace, nu se recomandă utilizarea parenterală a gluconatului de calciu (este posibil efect cardiotoxic crescut al glicozidelor).

Supradozare:
În cazul supradozării de medicament la animale se poate observa bradicardie, aritmie, scăderea tensiunii arteriale, hipercalcemie, vomă, pierderea apetitului, constipaţie.
În caz de supradozaj pronunţat, este indicată administrarea intravenoasă a medicamentelor care conţin calcitonină.

Incompatibilităţi majore:
Gluconatul de calciu este incompatibil în soluţie cu: emulsiile uleioase intravenoase, cu Amfotericina B, cefamendol naftat, cafalotin sodium, dobutamina clorhidrat, metilprednisolol succinat de sodiu şi metoclopramid clorhidrat.
Nu se recomandă utilizarea cu antibiotice din grupa tetraciclinei, deoarece medicamentul formează compuşi insolubili cu acestea (ceea ce duce la o scădere a eficacităţii). În timpul tratamentului cu glicozide cardiace, nu se recomandă utilizarea parenterală a gluconatului de calciu (este posibil efect cardiotoxic crescut al glicozidelor).

7. Evenimente adverse

Nu se cunosc.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranţei unui produs. Dacă observaţi orice reacţii adverse, chiar şi cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeţi că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactaţi în mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteţi raporta evenimente adverse către deţinătorul certificatului de înregistrare sau reprezentantul local al deţinătorului certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârşitul acestui prospect sau prin sistemul naţional de raportare: mvnotificare@ansa.gov.md, tel. 022-210-156.

8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare şi metode de administrare

Borgluconatul de calciu, încălzit la o temperatură de 35 – 37^{0}C, se administrează animalelor intravenos (lent), subcutanat sau intramuscular. În cazul administrării subcutanate sau intramusculare, doza de medicament se fracţionează şi se va administra în locuri diferite. Borgluconatul de calciu se administrează animalelor o dată, iar dacă este necesar, tratamentul se repetă în aceleaşi doze după 24 de ore.
Se va administra în perfuzii intravenoase lente. Pe cât posibil a se administra la temperatura corporală în următoarele doze:
Bovine, cabaline: 20 - 30 ml/100 kg greutate corporală, 1- 3 zile după caz;
Caprine şi ovine: 10 - 30 ml subcutanat, 2- 3 zile după caz;
Suine: 10 - 30 ml subcutanat, 2 - 3 zile după caz;
Câini, pisici: 1- 2 ml subcutanat, zilnic 2 - 3 zile după caz.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

9. Recomandări privind administrarea corectă

Dozele şi termenii de utilizare depind de greutatea corporală a animalului şi de evoluţia bolii.

10. Perioade de aşteptare

Carne şi organe - 0 zile.
Lapte - 0 zile.

11. Precauţii speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.
A se păstra la temperatură mai mică de 25°C.
A se feri de lumina directă a soarelui.
Nu utilizaţi acest medicament de uz veterinar după data expirării marcată pe etichetă după Exp. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

12. Precauţii speciale pentru eliminare

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deşeurile menajere.
Utilizaţi sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deşeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerinţele locale şi cu sistemele naţionale de colectare aplicabile. Aceste măsuri ar trebui să contribuie la protecţia mediului.
Solicitaţi medicului veterinar sau farmacistului informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar

Medicament de uz veterinar care se eliberează fără prescripţie.

14. Numerele certificatelor de înregistrare şi dimensiunile ambalajelor

250036

Flacoane din sticlă cu dop din cauciuc închis emetic şi capac securizat din aluminiu a câte 50, 100, 200 ml.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

15. Data ultimei revizuiri a prospectului

07/2025

Informaţii detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar (https://registru.ansa.gov.md/).

16. Date de contact

Deţinătorul certificatului de înregistrare şi producătorul responsabil pentru eliberarea seriei şi date de contact pentru raportarea reacţiilor adverse suspectate:
Republica Moldova
SA "Farmavet", mun. Chişinău, str. Petricani 198.
Tel.: 022 - 31-72-70; 022-31-72-67; 022- 99-92-89;
Fax: 022-31-72-68; www.farmavet.md
E-mail:farmavet2017@gmail.com

17. Alte informaţii

Codul ATCvet: QA12AX