Anexa nr. 2

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

PROSPECTUL

1. Denumirea medicamentului de uz veterinar

Glucoză 25% , soluţie injectabilă
Glucoză 40 %, soluţie injectabilă

2. Compoziţie

100 ml de medicament conţine (g):
Substanţa activă:
Glucoză anhidră - 25,0 şi 40,0

Excipient:

Compoziţia calitativă a excipienţilor şi a altor constituenţi	**Compoziţia cantitativă, dacă această informaţie este esenţială pentru administrarea corectă a medicamentului de uz veterinar**
Soluţie 0,1 N acid clorhidric	până la - pH 3,0-4,0
Clorura de sodiu	0,026 g
apă distilată pentru preparate injectabile	până la - 100 ml.

Soluţie limpede, inodoră, incoloră.

3. Specii ţintă
Bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine, câini, pisici.

4. Indicaţii de utilizare
Soluţia de glucoză 25% şi 40% este indicată în terapia complexă pentru a trata animalele cu forme severe de boli infecţioase acute şi parazitare ale sângelui, insuficienţă cardiovasculară cronică şi tensiune arterială scăzută. Glucoza face parte din soluţiile anti-şoc şi de înlocuire a sângelui, care sunt prescrise animalelor în stare de şoc, colaps sau cu pierderi mari de sânge. O soluţie de glucoză este utilizată la animale în caz de infecţii toxice, otrăviri cu medicamente, monoxid de carbon, mercur, arsen, acid cianhidric şi alte substanţe, edem pulmonar, boli hepatice (hepatită, ciroză), scăderea diurezei. Se prescrie în cazul boli ale tractului digestiv cu manifestări de intoxicaţie şi crampe musculare, hipotonie şi atonie a prestomacelor la rumegătoare, cetoză, hemoglobinurie postpartum şi toxemie la vaci lactante, cetonurie la ovine, hemoragii gastrointestinale, pulmonare şi alte sângerări interne (ca agent hemostatic), diateza hemoragică, iar pentru animalele slabe şi epuizate, ca remediu energetic şi supliment alimentar.

5. Contraindicaţii
Hiperglicemie, diabet zaharat, traumatismul cranio-cerebral sever, afectare acută vasculară cerebrală.

6. Atenţionări speciale

Atenţionări speciale:
Nu există.

Precauţii speciale pentru utilizarea în siguranţă la speciile ţintă:
Medicamentul se administrează intravenos lent, încălzit la temperatura corpului. La animalele deshidratate, produsul se utilizează numai după diluare cu apă distilată sau ser fiziologic steril, până la concentraţia de 5% (izotonă).
Dacă produsul ajunge în spaţiul perivenos, se recomandă badijonarea locală cu tinctură de iod. Administrarea intravenoasă trebuie efectuată lent. Inocularea rapidă poate produce tremurături musculare.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Precauţii speciale care vor fi luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:
Când lucraţi cu soluţie injectabilă Glucoză 25% sau 40%, trebuie să respectaţi regulile generale de igienă personală şi măsurile de siguranţă prevăzute atunci când lucraţi cu medicamente de uz veterinar.
În cazul contactului accidental al medicamentului cu pielea sau ochii, acestea trebuie spălate imediat cu multă apă. Persoanele cu hipersensibilitate la componentele medicamentului ar trebui să evite contactul direct cu medicamentul.

Precauţii speciale pentru protecţia mediului:
Nu este cazul.

Utilizarea în timpul gestaţiei, lactaţiei sau a ouatului:
Nu există restricţii.

Interacţiunea cu alte medicamente de uz veterinar şi alte forme de interacţiune:
Glucoza este un agent oxidant, de aceea nu se administrează în aceeaşi seringă cu hexametilentetramină, soluţii alcaline, anestezice generale, hipnotice şi soluţii alcaloide. Glucoza slăbeşte efectul analgezicelor, inactivează streptomicina, reduce eficacitatea nistatinei, prelungeşte efectul adrenalinei şi penicilinei.

Supradozare:
În caz de supradozaj, poate apărea comă hiperglicemică.

Incompatibilităţi majore:
Glucoza slăbeşte efectul analgezicelor, inactivează streptomicina şi reduce eficacitatea nistatinei.
Nu se va administra în aceeaşi seringă cu hexametilentetramină, soluţii alcaline, anestezice generale, hipnotice sau soluţii alcaloide.

7. Evenimente adverse
Nu sunt date.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranţei unui produs. Dacă observaţi orice reacţii adverse, chiar şi cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeţi că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactaţi în mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteţi raporta evenimente adverse către deţinătorul certificatului de înregistrare sau reprezentantul local al deţinătorului certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârşitul acestui prospect sau prin sistemul naţional de raportare: mvnotificare@ansa.gov.md, tel. 022-210-156.

8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare şi metode de administrare
Medicamentul se administrează intravenos, în doze (ml):
Bovine: 200 - 500 ml soluţie 25% per animal; 150 – 370 ml soluţie 40% per animal ;
Viţei: 100 - 200 ml soluţie 25% per animal; 100 - 150 ml soluţie 40% per animal ;
Cabaline: 150 – 300 ml soluţie 25% per animal; 150 - 300 ml soluţie 40% per animal ;
Porcine: 20 - 50 ml soluţie 25% per animal; 20 - 30 ml soluţie 40% per animal ;
Ovine, caprine: 40 - 130 ml soluţie 25% per animal; 40 - 70 ml soluţie 40% per animal ;
Câini, pisici: 8 - 40 ml soluţie 25% per animal; 5 - 15 ml soluţie 40% per animal.

9. Recomandări privind administrarea corectă
Medicamentul se administrează intravenos lent, încălzit la temperatura corpului.
Tratamentul poate fi repetat după 24 ore.

10. Perioade de aşteptare
Carne şi lapte: zero zile.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

11. Precauţii speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.
A se păstra în loc uscat.
A se feri de lumină.
A nu se păstra la temperatură mai mare de 25°C.
Nu utilizaţi acest medicament de uz veterinar după data expirării marcată pe etichetă după Exp. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

12. Precauţii speciale pentru eliminare

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deşeurile menajere.
Utilizaţi sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deşeurilor provenite din acestea, în conformitate cu legislaţia naţională şi cu sistemele de colectare aplicabile medicamentului de uz veterinar respectiv.
Solicitaţi medicului veterinar sau farmacistului informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar

Medicament de uz veterinar care se eliberează fără prescripţie.

14. Numerele certificatelor de înregistrare şi dimensiunile ambalajelor

Glucoză 25% - 250033
Glucoză 40 % - 250034

Flacoane de sticlă de 50, 100, 200, 400 şi 500 ml.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

15. Data ultimei revizuiri a prospectului

07/2025

Informaţii detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar (https://registru.ansa.gov.md/).

16. Date de contact

Deţinătorul certificatului de înregistrare şi producătorul responsabil pentru eliberarea seriei şi date de contact pentru raportarea reacţiilor adverse suspectate:
Republica Moldova
SA "Farmavet", mun. Chişinău, str. Petricani 198.
Tel.: 022 - 31-72-70; 022-31-72-67; 022- 99-9289;
Fax: 022-31-72-68; www.farmavet.md
E-mail:farmavet2017@gmail.com

17. Alte informaţii

Codul ATCvet: QB05CX01

