

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

ANTIPAR

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

1 ml conține:

Substanța activă:

Verde malahit – 0,2% (2 mg);

Formalină – 10% (100 mg).

Excipienți:

Compoziția calitativă a excipienților și a altor constituenți	Compoziția cantitativă, dacă această informație este esențială pentru administrarea corectă a medicamentului de uz veterinar
Apă distilată	până la 1 ml.

Soluție transparentă de culoare albastru întunecat.

3. INFORMAȚII CLINICE

3.1 Specii țintă

Pești decorativi de acvariu.

3.2 Indicații de utilizare pentru fiecare specie țintă

Antipar este recomandat pentru tratamentul și prevenirea bolilor infecțioase și parazitare ale peștilor decorativi precum: necroza înotătoarelor, saprolegnioză, ihtioftirius, criptocarionoză, chilodoneloză, tricotfioză, criptobioză, apiosomiază, oodinioză, brooklynelloză, heteropolarioză, tetrahimenoză, uronemoză, tricotfioză, costiază, dactiligiroză, girodactiloză.

3.3 Contraindicații

Este interzisă utilizarea medicamentului de uz veterinar pentru tratarea peștilor dintr-un acvariu cu organisme acvatice nevertebrate.

3.3 Atenționări speciale

Antipar nu este destinat tratării peștelor care sunt destinate în consum uman.

3.5 Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

Particularitățile acțiunii în caz de administrare pentru prima dată și în caz de anulare a medicamentului nu sunt stabilite.

Evitați încălcarea schemei de tratament, deoarece acest lucru poate reduce eficacitatea. În cazul omiterii uneia sau mai multor doze, tratamentul trebuie reluat cât mai curând posibil în doza recomandată.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu Antipar e important de respectat regulile generale de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.

În timpul lucrului nu sunt permise fumatul, consumul de băuturi și alimente.

După finisarea lucrului trebuie spălate bine mâinile cu apă caldă și săpun.

În caz de contact accidental al medicamentului cu pielea sau mucoasele ochilor, acestea trebuie clătite cu multă apă.

Persoanele cu hipersensibilitate la componentele medicamentului trebuie să evite contactul direct cu Antipar.

În caz de reacții alergice sau ingerare accidentală a medicamentului, trebuie să contactați imediat o unitate medicală (să aveți la sine prospectul de utilizare a medicamentului sau eticheta).

Precauții speciale pentru protecția mediului:

Medicamentul de uz veterinar nu trebuie lăsat să pătrundă în apele de suprafață.

3.6 Evenimente adverse

Specii țintă: Pești decorativi de acvariu.

În cazul utilizării medicamentului Antipar, în conformitate cu indicațiile prescrise, efecte secundare și complicații la pești în general nu se observă. În caz dacă unele specii de pești de acvariu sunt hipersensibile la medicament și apar complicații, tratamentul se întrerupe, iar peștii se transferă într-un acvariu cu apă curată.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței medicamentului de uz veterinar. Rapoartele se trimit, de preferință prin medicul veterinar, fie deținătorului certificatului de înregistrare sau reprezentantului local al acestuia, fie Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor prin sistemul național de raportare. Consultați, de asemenea, secțiunea 16 din prospect pentru datele de contact respective.

3.7 Utilizarea în timpul gestației, lactației sau a ouatului

Nu este cazul.

3.8 Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune

Antipar nu trebuie utilizat împreună cu medicamentele care conțin săruri de argint, mercur și cupru, oxidanți și baze.

3.9 Căi de administrare și doze

Antipar se utilizează prin metoda băilor de scurtă sau de lungă durată.

În scop preventiv, se efectuează o dată băi de scurtă durată, utilizând medicamentul în doză de 1 ml la 10 litri de apă, cu un timp de expunere de 3 ore.

În scop terapeutic, se efectuează de două ori băi de scurtă durată, cu un interval de 24 de ore, utilizând medicamentul în doză de 1 ml la 10 litri de apă, cu o expunere de 3 ore, sau băile de lungă durată, utilizând medicamentul în doză de 1 ml de medicament la 50 litri de apă, cu o expunere de la 3 zile până la 8 zile (până la dispariția semnelor clinice ale bolii).

Înainte de efectuarea băilor de scurtă durată dintr-un acvariu (bazin) nefavorabil la boală se prind 2-3 pești cu semne clinice pronunțate ale bolii și se plasează într-un recipient cu o soluție medicamentată (1 ml de medicament la 10 litri de apă) și se observă peștii timp de 15 minute.

Dacă peștii prezintă semne de anxietate (mișcări bruște, neobișnuite), aceștia sunt transferați în apă curată.

Dacă peștii nu prezintă complicații, atunci sunt tratați toți peștii din acvariu (bazin).

Pentru aceasta, peștii sunt prinși într-o cușcă, care este plasată într-o soluție medicamentată. După o expunere de 3 ore, cușca este transferată în acvariu (bazin) principal, lăsând peștii în ea până la următorul tratament. După tratamente repetate, peștii sunt eliberați din cușcă în acvariu (bazin).

Băile de lungă durată sunt utilizate pentru a trata peștii foarte sensibili la medicamente și transferuri, precum și peștii tineri. În acest scop, Antipar se adaugă într-un acvariu sau bazin cu pești decorativi în proporție de 1 ml la 50 l de apă, se sting corpurile de iluminat și se asigură o bună aerare a apei.

În timpul tratamentului, la fiecare 3 zile se adaugă în apă 1/2 din doza terapeutică a medicamentului.

Filtrele nu se utilizează în timpul tratamentului peștilor, vegetația acvatică și solul nu se îndepărtează din acvariu. Temperatura din acvariu trebuie menținută la + 24°C - +26°C, iar pH-ul - 5,5-6,8.

După finalizarea procedurii de tratament, apa din acvariu este dezactivată prin trecerea acesteia printr-un filtru de carbon. Dacă este necesar, tratamentul poate fi repetat după 5 zile.

Pentru acvariile cu pești bolnavi, trebuie prevăzute echipamente separate (plase, pulverizatoare, hrănitore, cuști, raclete, termometre etc.).

3.10 Simptome de supradozaj (și, după caz, proceduri de urgență și antidoturi)

În caz de supradozaj al medicamentului, la pești este posibilă dereglarea echilibrului și coordonării mișcărilor (înot rapid și haotic). În acest caz, peștii trebuie transferați imediat într-un recipient cu apă curată.

3.11 Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare, inclusiv restricții privind utilizarea medicamentelor de uz veterinar antimicrobiene și antiparazitare, pentru a limita riscul de dezvoltare a rezistenței

Nu este cazul.

3.12 Perioade de așteptare

Nu este cazul.

4. INFORMAȚII FARMACOLOGICE IMUNOLOGICE

4.1 Codul ATCvet: QD08AX

4.2 Farmacodinamie

Substanțele active incluse în medicamentul de uz veterinar au un efect negativ asupra agenților patogeni ai infecțiilor bacteriene și fungice, protozoarelor și helminților localizați pe țesuturile tegumentare ale corpului, branhiilor și înnotătoarele peștilor și, de asemenea, promovează vindecarea leziunilor tisulare traumatice.

Mecanismul de acțiune al medicamentului se bazează pe legarea structurilor citoplasmice intracelulare cu verdele de malachit și denaturarea proteinelor cu formalină, ceea ce perturbă complet metabolismul agenților patogeni și provoacă moartea acestora.

4.3 Farmacocinetică –

Antipar, conform impactului său asupra organismului, este clasificat drept substanță moderat periculoasă (clasa de pericol 3 conform GOST 12.1.007), este puțin toxic pentru pești și, în dozele recomandate, nu are efect iritant local sau resorbtiv-toxic; este toxic pentru organismele acvatice nevertebrate.

5. INFORMAȚII FARMACEUTICE

5.1 Incompatibilități majore

Antipar este incompatibil cu medicamentele care conțin săruri de argint, mercur și cupru, oxidanți și baze.

5.2 Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate al medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 24 luni.

5.3 Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatură de la 0°C până la 25°C.

A se păstra separat de alimente și furaje.

A se păstra în loc uscat.

A se feri de lumina directă a soarelui.

5.4 Natura și compoziția ambalajului primar

Antipar este produs în sticle de polietilenă cu volum de 15 ml, sigilate cu capace de polimer cu filet, ambalate în cutii individuale de carton.

5.5 Precauții speciale pentru eliminarea medicamentului de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea acestor produse

Medicamentul nu trebuie eliminat în apele uzate sau deșeurile menajere.

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile care contribuie la protecția mediului.

6. NUMELE DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

SRL «AVZ S-P», Federația Rusă, 141300, Regiunea Moscova, or. Serghiev Posad, str. Tsentralnaya, 1/11.

7. NUMĂRUL(NUMERELE) CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

250090

8. DATA PRIMEI ÎNREGISTRĂRI

12/12/2025

9. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A REZUMATULUI CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

12/2025

10. CLASIFICAREA MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR

Medicament de uz veterinar se eliberează fără prescripție.

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).