

## PROSPECTUL

**1. Denumirea medicamentului de uz veterinar**  
Cardistim.

**2. Compoziție**

Fiecare g conține:

**Substanța activă:**

Pimobendan - 5,0 mg

**Excipienți:** glucoză, monohidrat de lactoză, carbonat de calciu, talc, amidon de cartof, orisil, croscarmeloză sodică, stearat de calciu, aspartam.

Comprimat biconvex, de formă alungită, cu linie de divizare la mijloc, de culoare albă sau gri deschis.

**3. Specii țintă**

Câini .

**4. Indicații de utilizare**

Tratamentul câinilor cu insuficiență cardiacă cronică:

- în cazul insuficienței cardiace, provocate de cardiomiopatie dilatativă sau insuficiența valvei bicuspidale ori tricuspide însoțită de simptome caracteristice;
- în cazul cardiomiopatiei dilatative în stadiul preclinic (decurgerea asimptomatică cu creșterea diametrului telesistolic și telediastolic al ventriculului stâng) la rasa doberman-pincer în urma diagnosticului ecocardiografic a bolilor cardiace;
- în boala degenerativă mixomatoasă a valvei mitrale în stadiul preclinic (decurgerea asimptomatică cu suflu sistolic mitral și simptome de cardiomegalie) cu scopul de amânare a apariției simptomelor clinice a insuficienței cardiace.

**5. Contraindicații**

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanța activă, în caz de cardiomiopatii hipertrofice sau stări clinice, în care nu poate fi majorat fluxul sanguin din cauza particularităților funcționale sau anatomice (de ex. stenoza aortei), și câinilor cu disfuncții hepatice.

**6. Atenționări speciale**

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

Medicamentul de uz veterinar trebuie administrat respectând același timp de administrare, în cazul omiterii unei doze se va evita administrarea unei doze mărite și se va recurge la reluarea dozei conform schemei de tratament.

Când se tratează câinii cu diabet zaharat, trebuie periodic verificate nivelurile de glucoză din sânge.

Animalelor cărora li se administrează pimobendan trebuie de efectuat monitorizarea ritmului cardiac. Dacă se observă o creștere a ritmului cardiac după administrare trebuie redusă doza.

În cazul utilizării medicamentului cu scop de tratament în degenerarea mixomatoasă a valvei mitrale în stadiul preclinic este necesară efectuarea unui diagnostic printr-un examen complex fizic și cardiologic, care trebuie să includă, la necesitate, ecocardiografia și radiografia.

Precauții speciale care vor fi luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:  
În timpul lucrului cu Cardistim e important de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.

Persoanelor cu hipesensibilitate cunoscută la substanță activă se recomandă evitarea contactului direct cu medicamentul dat.

În caz de contact accidental cu pielea sau tunicile mucoase oculare, ele se spală din abundență cu apă.

În caz de ingerare sau apariție a reacțiilor alergice e necesar de adresat la o instituție medicală (cu sine de avut eticheta sau prospectul de utilizare).

#### Gestație și lactație:

Studiile de laborator efectuate pe șobolani și iepuri nu au evidențiat efecte teratogene sau fetotoxice ale pimobendan-ului. Cu toate acestea, este toxic pentru femelele gestante și embriotoxic atunci când este administrat în doze mari și se excretă în lapte.

Siguranța medicamentului la cățele gestante și lactante nu a fost testată.

Medicamentul poate fi utilizat în timpul gestației și lactației numai după o evaluare a raportului beneficiu/risc, efectuată de către un medic veterinar.

#### Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

În timpul cercetărilor farmacologice, nu au fost observate interacțiuni între glicozida cardiacă ouabaina (strofantina) și pimobendan. Mărirea frecvenței cardiace indusă de pimobendan se reduce cu antagoniștii de Ca verapamil și diltiazem,  $\beta$ -antagonistul propranolol.

#### Supradozarea:

Supradozarea poate induce un efect cronotrop pozitiv, vomă, apatie, ataxie, sufluri cardiace și hipotensiune. În astfel de cazuri doza medicamentului trebuie redusă și a se recurge la tratament simptomatic corespunzător.

În cazul tratamentului de lungă durată (6 luni) a câinilor sănătoși de rasa Beagle, în doze de 3 și 5 ori mai mari decât cele recomandate, la unii câini s-a observat îngroșarea valvei mitrale și hipertrofia ventriculului stâng. Aceste schimbări sunt de origine farmacodinamică.

#### Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare:

Nu este cazul.

#### Incompatibilități majore:

Nu utilizați simultan cu antagoniștii canalelor de calciu,  $\beta$ -antagonistul propranolol, deoarece acestea reduc efectul terapeutic al pimobendanului.

### **7. Evenimente adverse**

Administrarea medicamentului de uz veterinar conform prospectului dat, de regulă nu provoacă reacții adverse.

În cazuri rare apare un efect cronotrop pozitiv nesemnificativ (creșterea frecvenței cardiace) și voma. Însă acestea pot fi evitate prin micșorarea dozei de medicament. Uneori se observă semne a diareei tranzitorii, anorexie și apatie. În unele cazuri de tratament îndelungat cu pimobendan, la câinii cu viciu mitral se observă regurgitare mitrală.

Deși nu este stabilită clar conexiunea cu acțiunea pimobendanului, în cazuri foarte rare, în timpul tratamentului se pot observa semne de impact asupra hemostazei primare (peteșii pe mucoase, hemoragii subcutanate) care dispar după încetarea tratamentului.

În caz de sensibilitate individuală crescută și apariție a reacțiilor alergice, administrarea medicamentului se stopează și se recurge la terapie simptomatică.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactați în mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimente adverse către deținătorul certificatului de înregistrare sau reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: mvnotificare@ansa.gov.md, tel. 022-210-156.

**8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare**

Medicamentul se administrează pe cale orală, cu 1 oră înainte de hrănirea animalului.

Doza medicamentului se indică individual de către medicul veterinar în dependență de severitatea bolii și starea animalului.

Doza zilnică de pimobendan este de 0,2-0,6 mg/ 1 kg greutate corporală și este divizată în doua prize, dimineața și seara.

Doza zilnică recomandată – 0,5 mg pimobendan / 1 kg greutate corporală.

**9. Recomandări privind administrarea corectă**

În prealabil important de a stabili greutatea corporală exactă a animalului în scopul administrării dozei corecte.

Pentru o dozare mai exactă, comprimatul poate fi divizat în două sau patru părți.

În caz de insuficiență cardiacă congestivă, medicul veterinar stabilește doza individuală, pentru a fi utilizată pe parcursul întregii vieți.

Acest medicament poate fi utilizat concomitent cu diuretice, spre exemplu furosemid.

**10. Perioade de așteptare**

Nu este cazul.

**11. Precauții speciale pentru depozitare**

A nu se lăsa la vederea și îndemîna copiilor.

A se feri de lumină.

A se păstra în loc uscat.

A se păstra la temperatură de la + 4°C până la + 25°C.

Termen de valabilitate al medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

**12. Precauții speciale pentru eliminare**

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile. Aceste măsuri ar trebui să contribuie la protecția mediului.

Solicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

**13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar**

Medicament de uz veterinar care se eliberează cu prescripție.

**14. Numerele certificatelor de înregistrare și dimensiunile ambalajelor**

260006

Comprimatele a câte 0,5 sau 1,0 g sunt ambalate a câte 10 în blister.

Blisterele sunt ambalate în cutii de carton a câte 2, 5, 10 bucăți.

**15. Data ultimei revizuirii a prospectului**

03/2026

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).

**16. Date de contact**

Deținătorul certificatului de înregistrare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

SRL „BROVAFARMA”, Ucraina, bd. Independenței 18-a, or. Brovarî, regiunea Kiev, 07400

Reprezentanți locali și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

**Republica Moldova**

SRL "ZooFarmAgro",

MD-2001, , mun. Chișinău, bd. Dacia 61H

tel.: (022) 855 073 / 069 827 427

e-mail: zoofarmagro@mail.ru;

www.zoofarmagro.md; www.zooshop.md

**17. Alte informații**

Codul ATCvet: QC01CE90