

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR**1. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR**

Ciflur

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

1 ml conține:

Substanța activă:

Ciflutrină – 10,0 mg

Excipienți:

Compoziția calitativă a excipienților și a altor constituenți	Compoziția cantitativă, dacă această informație este esențială pentru administrarea corectă a medicamentului de uz veterinar
Solvesso 200	400
Eutanol G	100
Ulei de vaselină	385

Soluție pentru uz extern

Soluție transparentă uleioasă, de culoare galbenă.

3. INFORMAȚII CLINICE**3.1 Specii țintă**

Bovine.

3.2 Indicații de utilizare pentru fiecare specie țintă

Protecția bovinelor împotriva invaziei de muște zoofile, țânțari, musculițe, tăuni și alte inasecte zburătoare în perioada pășunatului.

3.3 Contraindicații

Nu utilizați medicamentul la viței cu o greutate corporală mai mică de 100 kg!

3.4 Atenționări speciale

Nu utilizați recipiente goale rămase de la medicament în scopuri casnice.

3.5 Precauții speciale pentru utilizare**Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:**

Nu sunt.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În lucrul cu Ciflur, trebuie respectate regulile generale de igienă personală și măsurile de siguranță prevăzute pentru lucrul cu medicamente de uz veterinar.

La manipularea medicamentului de uz veterinar trebuie purtat echipament de protecție personal constând din halat, bonetă, mănuși, cizme din cauciuc.

La finisarea lucrului mâinile trebuie spălate cu apă caldă și săpun.

Persoanele cu hipersensibilitate la componentele produsului trebuie să evite contactul direct cu acesta.

În caz de contact accidental al medicamentului cu pielea sau mucoasele ochilor, acestea trebuie spălate cu multă apă. În caz de reacții alergice, reacții adverse sau în caz de ingerare accidentală a medicamentului, trebuie să contactați imediat o unitate medicală (să aveți la sine prospectul de utilizare a medicamentului sau eticheta).

Precauții speciale pentru protecția mediului:

Ciflur nu trebuie lăsat să pătrundă în apele de suprafață.

3.6 Evenimente adverse

Când este utilizat conform dozelor recomandate, nu se observă evenimente adverse. Reacțiile alergice sunt posibile la animalele hipersensibile.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței medicamentului de uz veterinar. Rapoartele se trimit, de preferință prin medicul veterinar, fie deținătorului certificatului de înregistrare sau reprezentantului local al acestuia, fie Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor prin sistemul național de raportare. Consultați, de asemenea, secțiunea 16 din prospect pentru datele de contact respective.

3.7 Utilizarea în timpul gestației, lactației sau a ouatului

Nu există informații privind impactul negativ asupra bovinelor în timpul gestației și lactației.

3.8 Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune

Nu se recomandă utilizarea simultană cu alte medicamente de uz veterinar insectoacaricide.

3.9 Căi de administrare și doze

Doza este de 5 ml per animal cu greutatea corporală de până la 300 kg și 10 ml per animal cu greutatea peste 300 kg.

Ciflur se aplică lent și prin frecare ușoară, folosind un dispozitiv dozator, pe pielea uscată, curată și nedeteriorată, de-a lungul coloanei vertebrale, de la greabăn până la regiunea crupei, la o temperatură ambiantă de maximum 25°C.

După aplicarea medicamentului, evitați contactul animalului cu apa (ploaie, înot) timp de 3 ore.

Vacile lactante trebuie tratate imediat după mulsul de seară.

Cel mai bun efect protector se obține prin tratarea simultană a întregii cirezi în primăvară, după ce acestea sunt scoase la pășune, cu tratamente ulterioare la fiecare 4-6 săptămâni.

3.10 Simptome de supradozaj (și, după caz, proceduri de urgență și antidoturi)

Medicamentul este considerat a fi puțin toxic pentru animalele cu sânge cald și, atunci, când este utilizat în dozele recomandate, nu se observă semne de supradozaj.

3.11 Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare, inclusiv restricții privind utilizarea medicamentelor de uz veterinar antimicrobiene și antiparazitare, pentru a limita riscul de dezvoltare a rezistenței

Nu este cazul.

3.12 Perioade de așteptare

Pentru carne și lapte - 0 zile.

4. INFORMAȚII FARMACOLOGICE IMUNOLOGICE

4.1 Codul ATCvet: QP53AC12

4.2 Farmacodinamie

Medicamentul Ciflur este un insectoacaricid cu acțiune de contact, repelent împotriva: muștelor zoofile (*Haematobia stimulans*, *Lyperosia irritans*, *L. titilans*, *Stomoxys calcitrans*, *Musca autumnalis*, *M. larvipara*, *M. amica* etc.); țânțarilor (*Aedes*, *Anopheles*, *Culex*); musculițe (*Boophthora*, *Simulium*, *Schaenbaueria*); insecte Ceratopogonide (*Culicoides*, *Forcipomyia*, *Zentocononops*); tăuni (*Chrysops*, *Haematopota*, *Tabanus*); muștele care produc noduli hipodermici (*Hypoderma bovis* și *H. lineatum*), căpușelor Ixodidae (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus rossicus*, *Dermacentor marginatus*).

Substanța activă a medicamentului, ciflutrina, aparține grupului de piretroizi sintetici de tipul al doilea, care se leagă selectiv de receptorii celulelor nervoase ale ectoparaziților și perturbă funcționarea canalelor de sodiu ale celulelor nervoase, ceea ce duce la o întârziere a repolarizării membranei și la inhibarea trecerii impulsurilor nervoase, afectarea coordonării, paralizie și moartea rapidă a insectelor.

4.3 Farmacocinetică

După aplicarea pe piele, produsul se distribuie pe întreaga suprafață a corpului și este resorbit de piele în cantități mici, oferind o acțiune insecticidă, acarică și repelentă de lungă durată. Ciflur aparține substanțelor cu toxicitate scăzută pentru animalele cu sânge cald și în dozele recomandate, nu prezintă efecte resorbtive-toxice sau iritante.

5. INFORMAȚII FARMACEUTICE

5.1 Incompatibilități majore

Nu se recomandă utilizarea simultană cu alte medicamente de uz veterinar insectoacaricide.

5.2 Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate al medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 24 luni. Termenul de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 2 luni, cu condiția ca produsul să fie păstrat în ambalajul producătorului, bine închis.

5.3 Precauții speciale pentru depozitare

- A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.
- A se păstra în loc uscat, bine ventilat.
- A se feri de lumina directă a soarelui.
- A se păstra la temperatură de la 8°C până la 25°C.
- A se păstra separat de alimente și furaje.

5.4 Natura și compoziția ambalajului primar

Flacoane de plastic de 500 ml cu dozator de 5 sau 10 ml. Pipete din polimer de 10,0 ml, combinate într-un ambalaj mono doză cu bandă.

5.5 Precauții speciale pentru eliminarea medicamentului de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea acestor produse

Medicamentul nu trebuie eliminat în apele uzate sau deșeurile menajere. Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile care contribuie la protecția mediului.

6. NUMELE DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

BROVAFARMA SRL

Bd. Nezavisimosti 18a, or. Brovary, Regiunea Kiev, 07400, Ucraina

Tel./Fax: +38 044 3300227;

E-mail: office@brovapharma.ua

www.brovapharma.ua

Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor
MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63

ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR

APROBAT

7. NUMĂRUL(NUMERELE) CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE
260007

8. DATA PRIMEI ÎNREGISTRĂRI
10/03/2026

9. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A REZUMATULUI CARACTERISTICILOR
MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR
03/2026

10. CLASIFICAREA MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR

Medicament de uz veterinar se eliberează cu prescripție.

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii
Moldova - Registrul de stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).