

PROSPECTUL

1. Denumirea medicamentului de uz veterinar

Stop-Stress^R pastile 2 și 5

2. Compoziție

Substanțe active:

Denumirea substanțelor active	Conținutul substanțelor active în 1 pastilă, mg	
	Stop-stres ^R pastile 2	Stop-stres ^R pastile 5
Acid aminofenilbutiric (fenibut)	100,0	250,0
Extract de gura lupului de Baikal	10,0	30,0
Extract de hamei	10,0	30,0
Extract de talpa găștei	10,0	30,0
Extract de <i>Rodiola Rosa</i>	10,0	30,0

Excipienți:

Compoziția calitativă a excipienților și a altor constituenți
Lactoză
Aspasvit C200
Celuloză microclistică
Stearat de calciu

Pastile perorale.

3. Specii țintă

Câini, pisici.

4. Indicații de utilizare

Stop-stress^R pastile 2 și 5 se indică pentru diminuarea excitației și corectarea dereglărilor psihogene de comportament la câini și pisici în situații de stres, fobii, agresivitate fără motiv aparent și supraexcitare sexuală (în complex cu preparate contraceptive).

5. Contraindicații

Sensibilitate individuală sporită a animalului la componentele medicamentului (inclusiv în anamneză), disfuncții a sistemului urogenital, tumori și diabet zaharat.

6. Atenționări speciale

Atenționări speciale:

Nu se administrează animalelor productive.

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

Se recomandă respectarea termenilor recomandați a administrărilor pentru a nu diminua eficiența terapeutică.

Precauții speciale care vor fi luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu Stop-stress^R pastile 2 și 5, e important de respectat regulile comune de igienă personală și tehnici securității prevăzute în lucru cu medicamentele de uz veterinar.

Persoanelor cu hipesensibilitate se recomandă evitarea contactului direct cu Stop-stress^R pastile 2 și 5. În caz de apariție a reacțiilor alergice e necesar de adresat la o instituție medicală (cu sine de avut eticheta sau prospectul de utilizare).

Precauții speciale pentru protecția mediului:

Nu este cazul.

Gestație și lactație:

Nu se recomandă administrarea Stop-stress^R pastile 2 și 5 animalelor gestante și în perioada de alăptare. În caz de necesitate în administrare a medicamentului femelelor pe perioada alăptării, hrănirea cu lapte maternă a cățeilor și motănașilor se stopează.

Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Stop-stress^R pastile 2 și 5 intensifică și prolonghează acțiunea tranchilizanților, a neurolepticilor și a preparatelor anticonvulsive, dacă sunt administrate concomitent.

Supradozare:

În caz de supradozare, animalul poate manifesta somnolență, greață, tensiune arterială scăzută, disfuncții a tractului digestiv. În astfel de cazuri se recurge la spălături gastrice, se indică enterosorbenți și remedii simptomatice conform instrucțiunilor.

Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare:

Nu este cazul.

Incompatibilități majore:

A nu se amesteca cu niciun alt medicament de uz veterinar.

7. Evenimente adverse

În cazul administrării conform instrucțiunii, evenimente adverse nu apar. În caz de sensibilitate individuală sporită a animalelor la componentele medicamentului, în rare cazuri animalele pot manifesta somnolență sau excitare, nervozitate, greață, reacții alergice. În astfel de cazuri administrarea se stopează și se recurge la terapie simptomatică și desensibilizantă.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactați în mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimente adverse către deținătorul certificatului de înregistrare sau reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: mvnotificare@ansa.gov.md, tel. 022-210-156.

8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare

Se administrează animalelor individual cu hrana sau forțat pe rădăcina limbii, de 2 ori pe zi. Dozajul se alege individual în dependență de greutatea corporală, tipul sistemului nervos și gradul de excitare a animalului, dozele medii sunt indicate în tabel:

Greutatea animalului, kg	Doză unică	
	Stop-stress ^R pastile 2	Stop-stress ^R pastile 5
până la 5	¼ pastilă	-
de la 5 la 10	¼ - ½ pastilă	-
de la 10 la 20	½ - 1 pastilă	-
de la 20 la 30	1 - 1 ½ pastilă	¼ - ½ pastilă
de la 30 la 40	1 ½ - 2 pastile	½ - 1 pastilă
de la 40 la 50	-	1 pastilă
mai mare de 50	-	1 - 2 pastile

Durata curei de tratament este de 15-20 zile. În caz de excitare intensă și dereglări psihogene de comportament (agresiune, fobii, hiperactivitate, vocalizare excesivă (lătrat, mieunat), comportament hipersexual, marcarea teritoriului, cura poate fi prelungită până la 4 săptămâni.

În cazul manifestărilor repetate a simptomelor de excitare sau dereglări de comportament, cura se reia în aceleași doze, conform aceeași scheme.

Cu scop preventiv a stresului (transportare, sosirea oaspeților, schimbarea anturajului, plecarea proprietarului, participarea la expoziții și competiții) medicamentul se administrează cu 3-5 zile până la și timpde 1-4 zile după expunerea factorilor stresanți (până la dispariția simptomelor de supraexcitare).

9. Recomandări privind administrarea corectă

Pentru a asigura dozarea corectă, trebuie stabilită cât mai precis greutatea corporală.

10. Perioade de așteptare

Nu este cazul.

11. Precauții speciale pentru depozitare

A se păstra în ambalaj închis al producătorului, la loc uscat, ferit de raze solare directe, separat de produse alimentare și furaje, la T°C de la +2°C până la +25°C. În locuri inaccesibile copiilor.

Nu utilizați acest medicament de uz veterinar după data expirării marcată pe etichetă după Exp. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

12. Precauții speciale pentru eliminare

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile. Aceste măsuri ar trebui să contribuie la protecția mediului.

Solicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar

Medicament de uz veterinar care se eliberează fără prescripție.

14. Numerele certificatelor de înregistrare și dimensiunile ambalajelor

190034

Medicament de uz veterinar care se eliberează fără prescripție.

15. Data ultimei revizuirii a prospectului

03/2026

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).

16. Date de contact

Deținătorul certificatului de înregistrare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

OOO "Apicenna", Federația Rusă

123242, or. Moscova, str. Drujinnikovskaia, 15, et.5, c I, oficiu 532/5,

Tel: 89626252752

Reprezentanți locali și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor
MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63

ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR

APROBAT

Republica Moldova

SRL "ZooFarmAgro", MD-2001,
mun. Chișinău, bd. Dacia 61H
022 855 073/069 827 427;
e-mail: zoofarmagro@mail.ru;
www.zoofarmagro.md; www.zooshop.md

17. Alte informații

Codul ATCvet: QN06BX22