Anexa nr. 2

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 6
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

PROSPECTUL

1. Denumirea medicamentului de uz veterinar

ASD® fracţia 3, soluţie
(ASD® - 3F - Antiseptic-stimulator Dorogov fracţia 3)

2. Compoziţie

Substanţe active:
Un complex cu un conţinut de cel puţin 90% de substanţe biologic active, care include
acizi carboxilici, aminoacizi (inclusiv dipeptide ciclice), hidrocarburi alifatice şi ciclice, alchilbenzeni, fenoli substituiţi, derivaţi alchili ai pirolului, amine alifatice, amide, compuşi organici cu grupa sulfhidril activă.

Excipienţi: apă.

Soluţie pentru uz extern.
Soluţie de culoare maro întunecată până la negru, cu miros caracteristic. Se permite formarea sedimentului de culoare întunecată.

3. Specii ţintă

Bovine, ovine, caprine, cabaline, porcine, păsări de curte.

4. Indicaţii de utilizare

ASD® - 3F - Antiseptic-stimulator Dorogov fracţia 3 este prescris bovinelor, ovinelor, caprinelor, cailor, porcilor şi păsărilor de curte pentru tratamentul rănilor proaspete de origine traumatică şi chirurgicală, dermatitelor, bolilor inflamatorii cronice ale pielii, ulcerelor trofice, fistulelor, rănilor purulente, bolilor copitelor, necrobacteriozei, precum şi pentru prevenirea şi tratamentul wohlfahrtiozei.

5. Contraindicaţii

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanţele active.

6. Atenţionări speciale

Atenţionări speciale:
Din cauza mirosului său specific, nu se recomandă aplicarea produsului pe glandele mamare ale animalelor care alăptează, al căror lapte este utilizat pentru consumul uman.
Medicamentul este permis pentru utilizare la animale tinere.

Precauţii speciale pentru utilizarea în siguranţă la speciile ţintă:
Particularităţi deosebite de acţiune a medicamentului la prima administrare sau în caz de anulare nu s-au stabilit.
Evitaţi încălcarea schemei de administrare prescrise a medicamentului de uz veterinar, deoarece acest lucru poate reduce eficacitatea terapeutică. În caz dacă intervalul între două administrări a fost accidental mărit, tratamentul trebuie reluat cât mai curând posibil, administrarea se reia în aceeaşi doză, conform aceeaşi scheme.

Precauţii speciale care vor fi luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:
Când lucraţi cu acest produs, respectaţi măsurile generale de igienă personală şi măsurile de siguranţă pentru manipularea medicamentelor de uz veterinar. Se recomandă purtarea mănuşilor de cauciuc şi a unui aparat respirator atunci când efectuaţi tratamente şi proceduri profilactice cu ajutorul acestui produs.
După finisarea lucrului, spălaţi-vă pe mâini cu apă caldă şi săpun.
Persoanele cu hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului trebuie să evite contactul direct cu ASD®-3F.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

În caz de contact accidental a medicamentului de uz veterinar cu pielea sau cu tunicile mucoase oftalmice, medicamentul trebuie îndepărtat imediat cu un tampon, apoi se spală din abundenţă cu apă.
În caz de apariţie a reacţiei alergice sau la ingerare accidentală, solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta.

Precauţii speciale pentru protecţia mediului:
ASD® -3F nu trebuie lăsat să pătrundă în apele de suprafaţă.

Alte precauţii:
Flacoanele metalice goale ale medicamentului nu trebuie dezasamblate sau incinerate.

Gestaţie şi lactaţie:
Medicamentul este permis pentru utilizare la animale gestante şi care alăptează.

Interacţiunea cu alte medicamente de uz veterinar şi alte forme de interacţiune:
Utilizarea medicamentului ASD®-3F nu exclude utilizarea altor medicamente de uz veterinar pentru terapia etiotropă, patogenetică şi simptomatică, cu excepţia medicamentelor pentru uz local, din cauza unei posibile scăderi a eficacităţii acestora.

Supradozare:
Simptome de supradozaj la animale nu s-au înregistrat.

Restricţii speciale de utilizare şi condiţii speciale de utilizare:
Nu este cazul.

Incompatibilităţi majore:
Nu se recomandă utilizarea cu alte preparate la nivel local al plăgilor.

7. Evenimente adverse

Când este utilizat conform acestor instrucţiuni, în general nu se observă evenimente adverse şi complicaţii.
În cazul unei sensibilităţi individuale crescute la medicament şi al apariţiei reacţiilor alergice, utilizarea acestuia este întreruptă, iar animalului i se prescriu antihistaminice şi alte terapii simptomatice.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranţei unui produs. Dacă observaţi orice reacţii adverse, chiar şi cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeţi că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactaţi în mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteţi raporta evenimente adverse către deţinătorul certificatului de înregistrare sau reprezentantul local al deţinătorului certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârşitul acestui prospect sau prin sistemul naţional de raportare: mvnotificare@ansa.gov.md, tel. 022-210-156.

8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare şi metode de administrare

Medicamentul se aplică local pe zonele afectate ale pielii animalelor, acoperind 2-3 cm de piele sănătoasă (pentru a preveni răspândirea inflamaţiei).
Se aplică nediluat (aerosol) sau sub formă de soluţii uleioase de 25-50%.
Soluţiile uleioase se prepară din produsul ambalat în flacoane de sticlă folosind ulei de ricin, seminţe de in, floarea-soarelui sau de peşte, la care se adaugă produsul într-un raport de 1:3 sau 1:1, amestecând bine.
Înainte de aplicarea produsului, se recomandă aseptizarea plăgii, curăţarea acesteia de puroi, exudat şi ţesut necrotic şi îndepărtarea blănii.
Înainte de utilizare, produsul trebuie menţinut la o temperatură de 15-25°C timp de cel puţin 5-6 ore. Animalele trebuie tratate în aer liber sau într-o încăpere bine ventilată.
Înainte de utilizare, agitaţi bine recipientul timp de câteva secunde şi, ţinându-l vertical, pulverizaţi de la o distanţă de 15-20 cm de zona afectată, distribuind uniform produsul pe suprafaţă.
După utilizare, întoarceţi recipientul cu susul în jos şi apăsaţi pulverizatorul până când se eliberează aer (pentru a curăţa duza de pulverizare).

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Pentru tratarea rănilor proaspete ale pielii şi pentru a preveni infectarea rănilor în timpul castrării şi tăierii cozii, decornării, marcării, crotaliere, abraziunilor, crăpăturilor şi tăieturilor pielii după tunsoare, în caz de ciugulirea păsărilor, aplicaţi produsul din recipientul cu aerosoli o singură dată pe zonele afectate ale pielii.
Pentru a preveni şi trata wohlfahrtioza, aplicaţi medicamentul din flaconul cu aerosol pe rănile proaspete, precum şi pe cele infestate cu muşte Wohlfahrtia, fără a curăţa sau îndepărta larvele.
Rănile se tratează o singură dată, în timp ce rănile cu vindecare lentă se tratează de două ori, la un interval de 48 de ore. Îndepărtaţi larvele moarte de pe rană la o oră după tratament.
Pentru răni purulente, eczeme, escare, dermatite, boli inflamatorii cronice ale pielii, răni cu vindecare lentă, piodermie, ulcere trofice şi canibalism la porci, aplicaţi medicamentul din flaconul cu aerosol pe pielea deteriorată o dată pe zi până când animalul se vindecă, dar nu mai mult de 14 zile.
Sau, ca parte a terapiei combinate, medicamentul din flaconul cu aerosol se aplică pe zonele afectate ale pielii o dată pe zi până când încetează eliminarea exudatuluiu purulent, dar nu mai mult de trei zile. Tratamentul este apoi continuat cu ASD®-10 o dată pe zi până când animalul se recuperează, dar nu mai mult de patru zile.
Alternativ, se utilizează soluţii uleioase de 25-50% ale medicamentului, ambalate în flacoane din sticlă, se aplică pe zonele afectate ale pielii o dată pe zi până când animalul se recuperează, dar nu mai mult de 21 de zile.
În tratarea rănilor infectate, cu vindecare lentă, a fistulelor şi a abceselor, zona afectată se spală cu o soluţie apoasă de 15-20% de ASD-2F - Antiseptic-stimulator Dorogov fracţia 2) până când încetează eliminarea exudatuluiu purulent, apoi se aplică un tampon de tifon îmbibat într-o soluţie uleioasă de ASD® - 3F - Antiseptic-stimulator Dorogov fracţia 3, care se fixează cu un bandaj. Tamponele cu conţinutul soluţiei medicamentoase se schimbă zilnic până când animalul se recuperează.
Pentru leziunile cutanate extinse, soluţia medicamentoasă se aplică alternativ pe diferite zone, acoperind maximum 10% din suprafaţa corporală a animalului la o singură aplicare.
Pentru terapia complexă a leziunilor şi afecţiunilor purulente-necrotice ale copitelor, medicamentul se aplică pe zonele afectate ale membrelor o dată pe zi până la recuperarea animalului, dar nu mai mult de şapte zile. Tratamentul se efectuează în asociere cu proceduri chirurgicale locale şi medicaţie specifică şi simptomatică.
Alternativ, ca parte a terapiei complexe, medicamentul se aplică pe zonele afectate ale membrelor o dată pe zi până la încetarea eliminarii exudatului purulent, dar nu mai mult de trei zile, apoi tratamentul continuă utilizând medicamentul ASD®-10 - o dată pe zi până când animalul se recuperează, dar nu mai mult de 11 zile.

9. Recomandări privind administrarea corectă

Se recomandă respectarea concentraţiilor şi intervalelor de administrare pentru a nu diminua din eficienţa medicamentului. În caz de omitere a unui dozaj, administrarea se reia cât de repede posibil în aceeaşi doză, conform aceeaşi scheme.

10. Perioade de aşteptare

Carne, organe, lapte, ouă: zero zile.
În cazul sacrificării forţate a unui animal, zonele tratate ale carcasei se curăţă şi se elimină.

11. Precauţii speciale pentru depozitare

A se păstra în ambalajul original bine închis.
A se proteja de lumină solară directă.
A se păstra la temperatura de la 2^0C până la 25^0C,
Flacoanele metalice a se păstra departe de dispozitivele de încălzire şi flăcările deschise.
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.
Termen de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: flacoane din sticlă - 30 de zile, iar flacoanele metalice cu aerosol - până la finele perioadei de valabilitate.
Nu utilizaţi acest medicament de uz veterinar după data expirării marcată pe etichetă după Exp. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

12. Precauții speciale pentru eliminare

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.
Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile care contribuie la protecția mediului.
Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar

Medicament de uz veterinar se eliberează fără prescripție.

14. Numerele certificatelor de înregistrare și dimensiunile ambalajelor

230150

Flacoane din sticlă de 100 ml cu capacitate corespunzătoare, sigilate cu dopuri de cauciuc și ranforsate cu capace din aluminiu sau aluminiu-plastic; Flacoane metalice cu aerosol de 150 ml, cu adaptor de pulverizare și capace din polimer. Fiecare ambalaj pentru consumatori este însoțită de instrucțiuni de utilizare.

15. Data ultimei revizuiri a prospectului

05/2026

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar (https://registru.ansa.gov.md/).

16. Date de contact

Deținătorul certificatului de înregistrare și producătorul responsabil pentru eliberarea serieișidate de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:
OOO NVȚ Agrovetzaşcita,
Federația Rusă, 141305, Regiunea Moscova, or. Serghiev Posad,
Strada Țentralinaia, bloc 1/11

Linia fierbinte: 8-800-700-19-93
www. avzvet.ru

Reprezentanți locali și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

Republica Moldova
SRL "ZooFarmAgro",
MD-2001, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Dacia 61-H
Te.: 022 855 073/069 827 427;
e-mail: zoofarmagro@mail.ru;
www.zoofarmagro.md; www.zooshop.md

17. Alte informații -