Anexa nr. 1

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

ASD® fracția 3, soluție
(ASD® - 3F - Antiseptic-stimulator Dorogov fracția 3)

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Substanțe active:
Un complex cu un conținut de cel puțin 90% de substanțe biologic active, care include
acizi carboxilici, aminoacizi (inclusiv dipeptide ciclice), hidrocarburi alifatice şi ciclice, alchilbenzeni, fenoli substituiți, derivați alchili ai pirolului, amine alifatice, amide, compuşi organici cu grupa sulfhidril activă.

Excipienți: apă.

Soluție pentru uz extern.
Soluție de culoare maro întunecată până la negru, cu miros caracteristic. Se permite formarea sedimentului de culoare întunecată.

3. INFORMAȚII CLINICE

3.1 Specii țintă

Bovine, ovine, caprine, cabaline, porcine, păsări de curte.

3.2 Indicații de utilizare pentru fiecare specie țintă

ASD® - 3F - Antiseptic-stimulator Dorogov fracția 3 este prescris bovinelor, ovinelor, caprinelor, cailor, porcilor şi păsărilor de curte pentru tratamentul rănilor proaspete de origine traumatică şi chirurgicală, dermatitelor, bolilor inflamatorii cronice ale pielii, ulcerelor trofice, fistulelor, rănilor purulente, bolilor copitelor, necrobacteriozei, precum şi pentru prevenirea şi tratamentul wohlfahrtiozei.

3.3 Contraindicații

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanțele active.

3.3 Atenționări speciale

Din cauza mirosului său specific, nu se recomandă aplicarea produsului pe glandele mamare ale animalelor care alăptează, al căror lapte este utilizat pentru consumul uman.
Medicamentul este permis pentru utilizare la animale tinere.

3.5 Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:
Particularități deosebite de acțiune a medicamentului la prima administrare sau în caz de anulare nu s-au stabilit.
Evitați încălcarea schemei de administrare prescrise a medicamentului de uz veterinar, deoarece acest lucru poate reduce eficacitatea terapeutică. În caz dacă intervalul între două administrări a fost accidental mărit, tratamentul trebuie reluat cât mai curând posibil, administrarea se reia în aceeaşi doză, conform aceeaşi scheme.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:
Când lucrați cu acest produs, respectați măsurile generale de igienă personală şi măsurile de siguranță pentru manipularea medicamentelor de uz veterinar. Se recomandă purtarea mănuşilor de cauciuc şi a unui aparat respirator atunci când efectuați tratamente şi proceduri profilactice cu ajutorul acestui produs.
După finisarea lucrului, spălați-vă pe mâini cu apă caldă şi săpun.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Persoanele cu hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului trebuie să evite contactul direct cu ASD®-3F.
În caz de contact accidental a medicamentului de uz veterinar cu pielea sau cu tunicile mucoase oftalmice, medicamentul trebuie îndepărtat imediat cu un tampon, apoi se spală din abundenţă cu apă.
În caz de apariţie a reacţiei alergice sau la ingerare accidentală, solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta.

Precauţii speciale pentru protecţia mediului:
ASD® -3F nu trebuie lăsat să pătrundă în apele de suprafaţă.

Alte precauţii:
Flacoanele metalice goale ale medicamentului nu trebuie dezasamblate sau incinerate.

3.6 Evenimente adverse
Când este utilizat conform acestor instrucţiuni, în general nu se observă evenimente adverse şi complicaţii.
În cazul unei sensibilităţi individuale crescute la medicament şi al apariţiei reacţiilor alergice, utilizarea acestuia este întreruptă, iar animalului i se prescriu antihistaminice şi alte terapii simptomatice.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranţei medicamentului de uz veterinar. Rapoartele se trimit, de preferinţă prin medicul veterinar, fie deţinătorului certificatului de înregistrare sau reprezentantului local al acestuia, fie Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor prin sistemul naţional de raportare. Consultaţi, de asemenea, secţiunea 16 din prospect pentru datele de contact respective.

3.7 Utilizarea în timpul gestaţiei, lactaţiei sau a ouatului
Medicamentul este permis pentru utilizare la animale gestante şi care alăptează.

3.8 Interacţiunea cu alte medicamente de uz veterinar şi alte forme de interacţiune
Utilizarea medicamentului ASD®-3F nu exclude utilizarea altor medicamente de uz veterinar pentru terapia etiotropă, patogenetică şi simptomatică, cu excepţia medicamentelor pentru uz local, din cauza unei posibile scăderi a eficacităţii acestora.

3.9 Căi de administrare şi doze
Medicamentul se aplică local pe zonele afectate ale pielii animalelor, acoperind 2-3 cm de piele sănătoasă (pentru a preveni răspândirea inflamaţiei).
Se aplică nediluat (aerosol) sau sub formă de soluţii uleioase de 25-50%.
Soluţiile uleioase se prepară din produsul ambalat în flacoane de sticlă folosind ulei de ricin, seminţe de in, floarea-soarelui sau de peşte, la care se adaugă produsul într-un raport de 1:3 sau 1:1, amestecând bine.
Înainte de aplicarea produsului, se recomandă aseptizarea plăgii, curăţarea acesteia de puroi, exudat şi ţesut necrotic şi îndepărtarea blănii.
Înainte de utilizare, produsul trebuie menţinut la o temperatură de 15-25°C timp de cel puţin 5-6 ore. Animalele trebuie tratate în aer liber sau într-o încăpere bine ventilată.
Înainte de utilizare, agitaţi bine recipientul timp de câteva secunde şi, ţinându-l vertical, pulverizaţi de la o distanţă de 15-20 cm de zona afectată, distribuind uniform produsul pe suprafaţă.
După utilizare, întoarceţi recipientul cu susul în jos şi apăsaţi pulverizatorul până când se eliberează aer (pentru a curăţa duza de pulverizare).
Pentru tratarea rănilor proaspete ale pielii şi pentru a preveni infectarea rănilor în timpul castrării şi tăierii cozii, decornării, marcării, crotaliere, abraziunilor, crăpăturilor şi tăieturilor pielii după tunsoare, în caz de ciugulirea păsărilor, aplicaţi produsul din recipientul cu aerosoli o singură dată pe zonele afectate ale pielii.
Pentru a preveni şi trata wohlfahrtioza, aplicaţi medicamentul din flaconul cu aerosol pe rănile proaspete, precum şi pe cele infestate cu muşte Wohlfahrtia, fără a curăţa sau îndepărta larvele.
Rănile se tratează o singură dată, în timp ce rănile cu vindecare lentă se tratează de două ori, la un interval de 48 de ore. Îndepărtaţi larvele moarte de pe rană la o oră după tratament.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Pentru răni purulente, eczeme, escare, dermatite, boli inflamatorii cronice ale pielii, răni cu vindecare lentă, piodermie, ulcere trofice şi canibalism la porci, aplicaţi medicamentul din flaconul cu aerosol pe pielea deteriorată o dată pe zi până când animalul se vindecă, dar nu mai mult de 14 zile.
Sau, ca parte a terapiei combinate, medicamentul din flaconul cu aerosol se aplică pe zonele afectate ale pielii o dată pe zi până când încetează eliminarea exudatuluiu purulent, dar nu mai mult de trei zile. Tratamentul este apoi continuat cu ASD®-10 o dată pe zi până când animalul se recuperează, dar nu mai mult de patru zile.
Alternativ, se utilizează soluţii uleioase de 25-50% ale medicamentului, ambalate în flacoane din sticlă, se aplică pe zonele afectate ale pielii o dată pe zi până când animalul se recuperează, dar nu mai mult de 21 de zile.
În tratarea rănilor infectate, cu vindecare lentă, a fistulelor şi a abceselor, zona afectată se spală cu o soluţie apoasă de 15-20% de ASD-2F - Antiseptic-stimulator Dorogov fracţia 2) până când încetează eliminarea exudatuluiu purulent, apoi se aplică un tampon de tifon îmbibat într-o soluţie uleioasă de ASD® - 3F - Antiseptic-stimulator Dorogov fracţia 3, care se fixează cu un bandaj. Tamponele cu conţinutul soluţiei medicamentoase se schimbă zilnic până când animalul se recuperează.
Pentru leziunile cutanate extinse, soluţia medicamentoasă se aplică alternativ pe diferite zone, acoperind maximum 10% din suprafaţa corporală a animalului la o singură aplicare.
Pentru terapia complexă a leziunilor şi afecţiunilor purulente-necrotice ale copitelor, medicamentul se aplică pe zonele afectate ale membrelor o dată pe zi până la recuperarea animalului, dar nu mai mult de şapte zile. Tratamentul se efectuează în asociere cu proceduri chirurgicale locale şi medicaţie specifică şi simptomatică.
Alternativ, ca parte a terapiei complexe, medicamentul se aplică pe zonele afectate ale membrelor o dată pe zi până la încetarea eliminarii exudatului purulent, dar nu mai mult de trei zile, apoi tratamentul continuă utilizând medicamentul ASD®-10 - o dată pe zi până când animalul se recuperează, dar nu mai mult de 11 zile.

3.10 Simptome de supradozaj (şi, după caz, proceduri de urgenţă şi antidoturi)
Simptome de supradozaj la animale nu s-au înregistrat.

3.11 Restricţii speciale de utilizare şi condiţii speciale de utilizare, inclusiv restricţii privind utilizarea medicamentelor de uz veterinar antimicrobiene şi antiparazitare, pentru a limita riscul de dezvoltare a rezistenţei
Nu este cazul.

3.12 Perioade de aşteptare
Carne, organe, lapte, ouă: zero zile.
În cazul sacrificării forţate a unui animal, zonele tratate ale carcasei se curăţă şi se elimină.

4. INFORMAŢII FARMACOLOGICE

4.1 Codul ATCvet: –
Grupa farmacoterapeutică: agenţi antiseptici; agenţi dermatotropi.

4.2 Farmacodinamie
Complexul de substanţe biologic active incluse în compoziţia medicamentului de uz veterinar îmbunătăţeşte procesele metabolice la locul inflamaţiei, posedă acţiune locală de vindecare a rănilor, antiinflamatorie şi antiseptică, stimulează activitatea sistemului reticuloendotelial, inhibă creşterea microflorei patogene, normalizează trofica şi accelerează procesele de regenerare a ţesuturilor afectate.
Mirosul specific al ASD®-3F posedă acţine repelentă asupra insectelor diptere (*Wohlfahrtia magnifica*), care durează până la 14 zile după o singură aplicare pe suprafaţa plăgii. Larvele de muscă Wohlfahrtia magnifica mor în decurs de o oră de la tratament.

După gradul de impact asupra organismului, face parte din substanţele cu pericol moderat (clasa de pericol 3 conform GOST 12.1.007).

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

5. INFORMAȚII FARMACEUTICE

5.1 Incompatibilități majore
Nu se recomandă utilizarea cu alte preparate la nivel local al plăgilor.

5.2 Termen de valabilitate
Termen de valabilitate a preparatului în ambalajul producătorului: 36 luni.
Termen de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: flacoane din sticlă - 30 de zile, iar flacoanele metalice cu aerosol - până la finele perioadei de valabilitate.

5.3 Precauții speciale pentru depozitare
A se păstra în ambalajul original bine închis.
A se proteja de lumină solară directă.
A se păstra la temperatura de la 2^0C până la 25^0C,
Flacoanele metalice a se păstra departe de dispozitivele de încălzire şi flăcările deschise.
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

5.4 Natura şi compoziția ambalajului primar
Flacoane din sticlă de 100 ml cu capacitate corespunzătoare, sigilate cu dopuri de cauciuc şi ranforsate cu capace din aluminiu sau aluminiu-plastic; Flacoane metalice cu aerosol de 150 ml, cu adaptor de pulverizare şi capace din polimer. Fiecare ambalaj pentru consumatori este însoțită de instrucțiuni de utilizare.

5.5 Precauții speciale pentru eliminarea medicamentului de uz veterinar neutilizate sau a deşeurilor provenite din utilizarea acestor produse
Medicamentul nu trebuie eliminat în apele uzate sau deşeurile menajere.
Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deşeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale şi cu sistemele naționale de colectare aplicabile care contribuie la protecția mediului.
Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

6. NUMELE DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE
OOO NVȚ Agrovetzaşcita,
Federația Rusă, 141305, Regiunea Moscova, or. Serghiev Posad,
Strada Țentralinaia, bloc 1/11

7. NUMĂRUL (NUMERELE) CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE
230150

8. DATA PRIMEI ÎNREGISTRĂRI
12.12.2023

9. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A REZUMATULUI CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR
05/2026

10. CLASIFICAREA MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
Medicament de uz veterinar se eliberează fără prescripție.

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de stat al medicamentelor de uz veterinar (https://registru.ansa.gov.md/).