Anexa nr. 2

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

PROSPECTUL

1. Denumirea medicamentului de uz veterinar

ANTIPAR

2. Compoziţie

1 ml conţine:
Substanţa activă:
Verde malahit - 0,2% (2 mg);
Formalină – 10% (100 mg).

Excipienţi: apă distilată până la 1 ml.

Soluţie transparentă de culoare albastru întunecat.

3. Specii ţintă
Peşti decorativi de acvariu.

4. Indicaţii de utilizare
Antipar este recomandat pentru tratamentul şi prevenirea bolilor infecţioase şi parazitare ale peştilor decorativi precum: necroza înotătoarelor, saprolegnioză, ihtioftirius, criptocarionoză, chilodoneloză, tricofrioză, criptobioză, apiosomiază, oodinioză, brooklynelloză, heteropolarioză, tetrahimenoză, uronemoză, tricoftioză, costiază, dactiligiroză, girodactiloză.

5. Contraindicaţii
Este interzisă utilizarea medicamentului de uz veterinar pentru tratarea peştilor dintr-un acvariu cu organisme acvatice nevertebrate.

6. Atenţionări speciale

Atenţionări speciale:
Antipar nu este destinat tratării peştelor care sunt destinate în consum unman.

Precauţii speciale pentru utilizarea în siguranţă la speciile ţintă:
Particularităţile acţiuii în caz de administrare pentru prima dată şi în caz de anulare a medicamentului nu sunt stabilite.
Evitaţi încălcarea schemei de tratament, deoarece acest lucru poate reduce eficacitatea. În cazul omiterii uneia sau mai multor doze, tratamentul trebuie reluat cât mai curând posibil în doza recomandată.

Precauţii speciale care vor fi luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:
În timpul lucrului cu Antipar e important de respectat regulile generale de igienă personală şi a tehnicii securităţii prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.
În timpul lucrului nu sunt permise fumatul, consumul de băuturi şi alimente.
După finisarea lucrului trebuie spălate bine mâinile cu apă caldă şi săpun.
În caz de contact accidental al medicamentului cu pielea sau mucoasele ochilor, acestea trebuie clătite cu multă apă.
Persoanele cu hipersensibilitate la componentele medicamentului trebuie să evite contactul direct cu Antipar.
În caz de reacţii alergice sau ingerare accidentală a medicamentului, trebuie să contactaţi imediat o unitate medicală (să aveţi la sine prospectul de utilizare a medicamentului sau eticheta).

Precauţii speciale pentru protecţia mediului:
Medicamentul de uz veterinar nu trebuie lăsat să pătrundă în apele de suprafaţă.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Utilizarea în timpul gestaţiei, lactaţiei sau a ouatului
Nu este cazul.

Interacţiunea cu alte medicamente de uz veterinar şi alte forme de interacţiune:
Antipar nu trebuie utilizat împreună cu medicamentele care conţin săruri de argint, mercur şi cupru, oxidanţi şi baze.

Supradozare:
În caz de supradozaj al medicamentului, la peşti este posibilă dereglarea echilibrului şi coordonării mişcărilor (înot rapid şi haotic). În acest caz, peştii trebuie transferaţi imediat într-un recipient cu apă curată.

Restricţii speciale de utilizare şi condiţii speciale de utilizare:
Nu este cazul.

Incompatibilităţi majore:
Antipar este incompatibil cu medicamentele care conţin săruri de argint, mercur şi cupru, oxidanţi şi baze.

7. Evenimente adverse

În cazul utilizării medicamentului Antipar, în conformitate cu indicaţiile prescrise, efecte secundare şi complicaţii la peşti în general nu se observă. În caz dacă unele specii de peşti de acvariu sunt hipersensibile la medicament şi apar complicaţii, tratamentul se întrerupe, iar peştii se transferă într-un acvariu cu apă curată.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranţei unui produs. Dacă observaţi orice reacţii adverse, chiar şi cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeţi că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactaţi în mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteţi raporta evenimente adverse către deţinătorul certificatului de înregistrare sau reprezentantul local al deţinătorului certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârşitul acestui prospect sau prin sistemul naţional de raportare: mvnotificare@ansa.gov.md, tel. 022-210-156.

8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare şi metode de administrare

Antipar se utilizează prin metoda băilor de scurtă sau de lungă durată.

În scop preventiv, se efectuează o dată băi de scurtă durată, utilizând medicamentul în doză de 1 ml la 10 litri de apă, cu un timp de expunere de 3 ore.

În scop terapeutic, se efectuează de două ori băi de scurtă durată, cu un interval de 24 de ore, utilizând medicamentul în doză de 1 ml la 10 litri de apă, cu o expunere de 3 ore, sau băile de lungă durată, utilizând medicamentul în doză de 1 ml de medicament la 50 litri de apă, cu o expunere de la 3 zile până la 8 zile (până la dispariţia semnelor clinice ale bolii).

Înainte de efectuarea băilor de scurtă durată dintr-un acvariu (bazin) nefavorabil la boală se prind 2-3 peşti cu semne clinice pronunţate ale bolii şi se plasează într-un recipient cu o soluţie medicamentată (1 ml de medicament la 10 litri de apă) şi se observă peştii timp de 15 minute.
Dacă peştii prezintă semne de anxietate (mişcări bruşte, neobişnuite), aceştia sunt transferaţi în apă curată.
Dacă peştii nu prezintă complicaţii, atunci sunt trataţi toţi peştii din acvariu (bazin).
Pentru aceasta, peştii sunt prinşi într-o cuşcă, care este plasată într-o soluţie medicamentată. După o expunere de 3 ore, cuşca este transferată în acvariu (bazin) principal, lăsând peştii în ea până la următorul tratament. După tratamente repetate, peştii sunt eliberaţi din cuşcă în acvariu (bazin).

Băile de lungă durată sunt utilizate pentru a trata peştii foarte sensibili la medicamente şi transferuri, precum şi peştii tineri. În acest scop, Antipar se adaugă într-un acvariu sau bazin cu peşti decorativi în proporţie de 1 ml la 50 l de apă, se sting corpurile de iluminat şi se asigură o bună aerare a apei.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

În timpul tratamentului, la fiecare 3 zile se adaugă în apă 1/2 din doza terapeutică a medicamentului.
Dacă este necesar, tratamentul poate fi repetat după 5 zile.

9. Recomandări privind administrarea corectă

Filtrele nu se utilizează în timpul tratamentului peştilor, vegetaţia acvatică şi solul nu se îndepărtează din acvariu. Temperatura din acvariu trebuie menţinută la + 24°C - +26°C, iar pH-ul - 5,5-6,8.
După finalizarea procedurii de tratament, apa din acvariu este dezactivată prin trecerea acesteia printr-un filtru de carbon.
Pentru acvariile cu peşti bolnavi, trebuie prevăzute echipamente separate (plase, pulverizatoare, hrănitoare, cuşti, raclete, termometre etc.).

10. Perioade de aşteptare

Nu este cazul.

11. Precauţii speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.
A se păstra la temperatură de la 0°C până la 25°C.
A se păstra separat de alimente şi furaje.
A se păstra în loc uscat.
A se feri de lumina directă a soarelui.
Nu utilizaţi acest medicament de uz veterinar după data expirării marcată pe etichetă după Exp. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

12. Precauţii speciale pentru eliminare

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deşeurile menajere.
Utilizaţi sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deşeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerinţele locale şi cu sistemele naţionale de colectare aplicabile care contribue la protecţia mediului.
Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar

Medicament de uz veterinar se eliberează fără prescripţie.

14. Numerele certificatelor de înregistrare şi dimensiunile ambalajelor

250090

Antipar este produs în sticle de polietilenă cu volum de 15 ml, 20 ml sigilate cu capace de polimer cu filet, ambalate în cutii individuale de carton.

15. Data ultimei revizuiri a prospectului

06/2026

Informaţii detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar (https://registru.ansa.gov.md/).

16. Date de contact

Deţinătorul certificatului de înregistrare şi producătorul responsabil pentru eliberarea serieişi date de contact pentru raportarea reacţiilor adverse suspectate:
SRL «AVZ S-P», Federaţia Rusă, 141300, Regiunea Moscova, or. Serghiev Posad, str. Ţentralinaya, 1/11.
Informaţii despre medicament sunt postate pe site-ul www.avzvet.ru

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Reprezentanți locali și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

Republica Moldova
SRL "ZooFarmAgro",
MD-2001, mun. Chişinău, str. Cameniţa, 4a
tel.: (022) 855 073; tel.:(022) 355 240; gsm.: 069 827 427
e-mail: zoofarmagro@mail.ru;
www.zoofarmagro.md; www.zooshop.md

17. Alte informații -
Codul ATCvet: QD08AX