Anexa nr. 1

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

ANTIPAR

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

1 ml conține:
Substanța activă:
Verde malahit – 0,2% (2 mg);
Formalină – 10% (100 mg).

Excipienți:

Compoziția calitativă a excipienților și a altor constituenți	**Compoziția cantitativă, dacă această informație este esențială pentru administrarea corectă a medicamentului de uz veterinar**
Apă distilată	până la 1 ml.

Soluție transparentă de culoare albastru întunecat.

3. INFORMAȚII CLINICE

3.1 Specii țintă
Pești decorativi de acvariu.

3.2 Indicații de utilizare pentru fiecare specie țintă
Antipar este recomandat pentru tratamentul și prevenirea bolilor infecțioase și parazitare ale peștilor decorativi precum: necroza înotătoarelor, saprolegnioză, ihtioftirius, criptocarionoză, chilodoneloză, tricofrioză, criptobioză, apiosomiază, oodinioză, brooklynelloză, heteropolarioză, tetrahimenoză, uronemoză, tricoftioză, costiază, dactiligiroză, girodactiloză.

3.3 Contraindicații
Este interzisă utilizarea medicamentului de uz veterinar pentru tratarea peștilor dintr-un acvariu cu organisme acvatice nevertebrate.

3.3 Atenționări speciale
Antipar nu este destinat tratării peștelor care sunt destinate în consum unman.

3.5 Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:
Particularitățile acțiuii în caz de administrare pentru prima dată și în caz de anulare a medicamentului nu sunt stabilite.
Evitați încălcarea schemei de tratament, deoarece acest lucru poate reduce eficacitatea. În cazul omiterii uneia sau mai multor doze, tratamentul trebuie reluat cât mai curând posibil în doza recomandată.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:
În timpul lucrului cu Antipar e important de respectat regulile generale de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

În timpul lucrului nu sunt permise fumatul, consumul de băuturi şi alimente.
După finisarea lucrului trebuie spălate bine mâinile cu apă caldă şi săpun.
În caz de contact accidental al medicamentului cu pielea sau mucoasele ochilor, acestea trebuie clătite cu multă apă.
Persoanele cu hipersensibilitate la componentele medicamentului trebuie să evite contactul direct cu Antipar.
În caz de reacţii alergice sau ingerare accidentală a medicamentului, trebuie să contactaţi imediat o unitate medicală (să aveţi la sine prospectul de utilizare a medicamentului sau eticheta).

Precauţii speciale pentru protecţia mediului:
Medicamentul de uz veterinar nu trebuie lăsat să pătrundă în apele de suprafaţă.

3.6 Evenimente adverse
Specii ţintă: Peşti decorativi de acvariu.

În cazul utilizării medicamentului Antipar, în conformitate cu indicaţiile prescrise, efecte secundare şi complicaţii la peşti în general nu se observă. În caz dacă unele specii de peşti de acvariu sunt hipersensibile la medicament şi apar complicaţii, tratamentul se întrerupe, iar peştii se transferă într-un acvariu cu apă curată.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranţei medicamentului de uz veterinar. Rapoartele se trimit, de preferinţă prin medicul veterinar, fie deţinătorului certificatului de înregistrare sau reprezentantului local al acestuia, fie Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor prin sistemul naţional de raportare. Consultaţi, de asemenea, secţiunea 16 din prospect pentru datele de contact respective.

3.7 Utilizarea în timpul gestaţiei, lactaţiei sau a ouatului
Nu este cazul.

3.8 Interacţiunea cu alte medicamente de uz veterinar şi alte forme de interacţiune
Antipar nu trebuie utilizat împreună cu medicamentele care conţin săruri de argint, mercur şi cupru, oxidanţi şi baze.

3.9 Căi de administrare şi doze
Antipar se utilizează prin metoda băilor de scurtă sau de lungă durată.

În scop preventiv, se efectuează o dată băi de scurtă durată, utilizând medicamentul în doză de 1 ml la 10 litri de apă, cu un timp de expunere de 3 ore.

În scop terapeutic, se efectuează de două ori băi de scurtă durată, cu un interval de 24 de ore, utilizând medicamentul în doză de 1 ml la 10 litri de apă, cu o expunere de 3 ore, sau băile de lungă durată, utilizând medicamentul în doză de 1 ml de medicament la 50 litri de apă, cu o expunere de la 3 zile până la 8 zile (până la dispariţia semnelor clinice ale bolii).

Înainte de efectuarea băilor de scurtă durată dintr-un acvariu (bazin) nefavorabil la boală se prind 2-3 peşti cu semne clinice pronunţate ale bolii şi se plasează într-un recipient cu o soluţie medicamentată (1 ml de medicament la 10 litri de apă) şi se observă peştii timp de 15 minute.
Dacă peştii prezintă semne de anxietate (mişcări bruşte, neobişnuite), aceştia sunt transferaţi în apă curată.
Dacă peştii nu prezintă complicaţii, atunci sunt trataţi toţi peştii din acvariu (bazin).
Pentru aceasta, peştii sunt prinşi într-o cuşcă, care este plasată într-o soluţie medicamentată. După o expunere de 3 ore, cuşca este transferată în acvariu (bazin) principal, lăsând peştii în ea până la următorul tratament. După tratamente repetate, peştii sunt eliberaţi din cuşcă în acvariu (bazin).

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Băile de lungă durată sunt utilizate pentru a trata peştii foarte sensibili la medicamente şi transferuri, precum şi peştii tineri. În acest scop, Antipar se adaugă într-un acvariu sau bazin cu peşti decorativi în proporţie de 1 ml la 50 l de apă, se sting corpurile de iluminat şi se asigură o bună aerare a apei.
În timpul tratamentului, la fiecare 3 zile se adaugă în apă 1/2 din doza terapeutică a medicamentului.
Filtrele nu se utilizează în timpul tratamentului peştilor, vegetaţia acvatică şi solul nu se îndepărtează din acvariu. Temperatura din acvariu trebuie menţinută la + 24°C - +26°C, iar pH-ul - 5,5-6,8.
După finalizarea procedurii de tratament, apa din acvariu este dezactivată prin trecerea acesteia printr-un filtru de carbon. Dacă este necesar, tratamentul poate fi repetat după 5 zile.
Pentru acvariile cu peşti bolnavi, trebuie prevăzute echipamente separate (plase, pulverizatoare, hrănitoare, cuşti, raclete, termometre etc.).

3.10 Simptome de supradozaj (şi, după caz, proceduri de urgenţă şi antidoturi)
În caz de supradozaj al medicamentului, la peşti este posibilă dereglarea echilibrului şi coordonării mişcărilor (înot rapid şi haotic). În acest caz, peştii trebuie transferaţi imediat într-un recipient cu apă curată.

3.11 Restricţii speciale de utilizare şi condiţii speciale de utilizare, inclusiv restricţii privind utilizarea medicamentelor de uz veterinar antimicrobiene şi antiparazitare, pentru a limita riscul de dezvoltare a rezistenţei
Nu este cazul.

3.12 Perioade de aşteptare
Nu este cazul.

4. INFORMAŢII FARMACOLOGICE IMUNOLOGICE

4.1 Codul ATCvet: QD08AX

4.2 Farmacodinamie
Substanţele active incluse în medicamentul de uz veterinar au un efect negativ asupra agenţilor patogeni ai infecţiilor bacteriene şi fungice, protozoarelor şi helminţilor localizaţi pe ţesuturile tegumentare ale corpului, branhiilor şi înnotătoarele peştilor şi, de asemenea, promovează vindecarea leziunilor tisulare traumatice.
Mecanismul de acţiune al medicamentului se bazează pe legarea structurilor citoplasmatice intracelulare cu verdele de malachit şi denaturarea proteinelor cu formalină, ceea ce perturbă complet metabolismul agenţilor patogeni şi provoacă moartea acestora.

4.3 Farmacocinetică –

Antipar, conform impactului său asupra organismului, este clasificat drept substanţă moderat periculoasă (clasa de pericol 3 conform GOST 12.1.007), este puţin toxic pentru peşti şi, în dozele recomandate, nu are efect iritant local sau resorbtiv-toxic; este toxic pentru organismele acvatice nevertebrate.

5. INFORMAŢII FARMACEUTICE

5.1 Incompatibilităţi majore
Antipar este incompatibil cu medicamentele care conţin săruri de argint, mercur şi cupru, oxidanţi şi baze.

5.2 Termen de valabilitate
Termenul de valabilitate al medicamentului de uz veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 24 luni.

5.3 Precauţii speciale pentru depozitare
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.
A se păstra la temperatură de la 0°C până la 25°C.
A se păstra separat de alimente şi furaje.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

A se păstra în loc uscat.
A se feri de lumina directă a soarelui.

5.4 Natura și compoziția ambalajului primar
Antipar este produs în sticle de polietilenă cu volum de 15 ml, 20 ml sigilate cu capace de polimer cu filet, ambalate în cutii individuale de carton.

5.5 Precauții speciale pentru eliminarea medicamentului de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea acestor produse
Medicamentul nu trebuie eliminat în apele uzate sau deșeurile menajere.
Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile care contribue la protecția mediului.

6. NUMELE DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE
SRL «AVZ S-P», Federația Rusă, 141300, Regiunea Moscova, or. Serghiev Posad, str. Țentralinaya, 1/11.

7. NUMĂRUL(NUMERELE) CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE
250090

8. DATA PRIMEI ÎNREGISTRĂRI
12/12/2025

9. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A REZUMATULUI CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR
06/2026

10. CLASIFICAREA MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
Medicament de uz veterinar se eliberează fără prescripție.

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de stat al medicamentelor de uz veterinar (https://registru.ansa.gov.md/).