

PROSPECTUL

1. Denumirea medicamentului de uz veterinar

Imcar-120

soluție injectabilă

2. Compoziție

1ml conține

Substanță activă:

Dipropionat de imidocarb - 120,0 mg.

Excipienți: polivinilpirolidonă, alcool benzilic, acid propionic, apă înalt purificată.

3. Specii țintă

Bovine, ovine, cabaline (cai de sport), câini.

4. Indicații de utilizare

Prevenire și tratament:

- rumegătoare biongulate (bovine, ovine) – babesioză, teilerioză, anaplasmoză și invazii mixte;
- cabaline – babesioză, anaplasmoză și invazii mixte;
- câini – babesioză acută, cronică, subclinică și atipică, ehrlichioză, anaplasmoză și infestări mixte.

Chimioprofilaxia babesiozei - administrarea medicamentului imediat după detectarea unei căpușe atașate și la animalele cu risc (câini de vânătoare). Efectul protector durează 14-21 de zile după administrare.

5. Contraindicații

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

Nu se utilizează în decurs de 4 săptămâni de la vaccinarea cu un vaccin viu împotriva babesiozei sau anaplasmozei.

6. Atenționări speciale

Atenționări speciale:

Studii specifice privind utilizarea medicamentului la animale tinere nu au fost efectuate.

În aceste cazuri, poate fi utilizat numai conform indicațiilor medicului veterinar, dacă beneficiul așteptat pentru animalul respectiv depășește riscul de complicații.

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

Agitați bine flaconul înainte de utilizare. Se recomandă utilizarea concomitentă de antihistaminice, conform instrucțiunilor de utilizare.

Din cauza unei posibile reacții dureroase, nu se recomandă administrarea în același loc mai mult de 10 ml la animalele mari și mai mult de 2 ml la animalele mici.

Precauții speciale care vor fi luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Personalul, care manipulează medicamentul Imcar 120, trebuie respecte regulile generale de igienă personală și măsurile de siguranță prevăzute în lucrul cu medicamente de uz veterinar.

Persoanele cu hipersensibilitate la componentele produsului trebuie să evite contactul direct cu acesta.

În caz de contact accidental al medicamentului cu pielea sau mucoasele ochilor, acestea trebuie spălate cu multă apă. În caz de reacții alergice, reacții adverse sau în caz de ingerare accidentală a medicamentului, trebuie să contactați imediat o unitate medicală (să aveți la sine prospectul de utilizare a medicamentului sau eticheta).

Precauții speciale pentru protecția mediului:

Produsul Imcar 120 nu trebuie lăsat să pătrundă în apele de suprafață.

Gestație și lactație:

Studii specifice privind utilizarea medicamentului la animale gestante sau care alăptează nu au fost efectuate. În aceste cazuri, medicamentul poate fi utilizat numai conform indicațiilor medicului veterinar, dacă beneficiul așteptat pentru animalul respectiv depășește riscul de complicații pentru făt.

Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu utilizați simultan cu medicamente organoclorurate, organofosforice și alți inhibitori de colinesterază.

Supradozare:

În caz de supradoză, animalele pot prezenta bradicardie, complicații respiratorii, anorexie, salivare excesivă, vomă, lăcrimare, transpirații, tremurături musculare, urinare și defecație frecvente. În acest caz, animalul trebuie tratat simptomatic.

Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare:

A se administra doar de către un medic veterinar.

Incompatibilități majore:

Nu utilizați simultan cu medicamente organoclorurate, organofosforice și alți inhibitori de colinesterază.

7. Evenimente adverse

În cazul când Imcar 120 este utilizat conform instrucțiunii, de regulă nu se observă evenimente adverse și complicații. În unele cazuri, pot apărea modificări localizate ale pielii (hiperemie, umflături dureroase) la locul injectării, dar aceste modificări dispar spontan. Dacă apar reacții alergice, întrerupeți utilizarea medicamentului și administrați terapie simptomatică.

Câinilor în cazul dezvoltării a reacțiilor adverse sau pentru a le preveni li se administrează atropină în doza terapeutică recomandată.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactați în mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimente adverse către deținătorul certificatului de înregistrare sau reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: mvnotificare@ansa.gov.md, tel. 022-210-156.

8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare

Bovine (subcutanat):

- babesioză – 2,4 mg la 1 kg greutate corporală (echivalent cu 2 ml la 100 kg greutate corporală), o singură administrare;
- anaplasmoză – 3,0 mg la 1 kg greutate corporală (echivalent cu 2,5 ml la 100 kg greutate corporală), o singură administrare;
- infestări mixte – 2,5 ml la 100 kg greutate corporală, o singură administrare;
- profilaxie – 2,4 mg la 1 kg greutate corporală, o singură administrare;

Ovine (intramuscular): Babesioză - 2,4 mg la 1 kg greutate corporală (echivalent cu 0,2 ml per 10 kg greutate corporală), o singură administrare;

Cabaline (intramuscular):

- *Babesia caballi* - 2,4 mg la 1 kg greutate corporală (echivalent cu 2 ml per 100 kg greutate corporală), se administrează - 2 injecții la interval de o zi;
- *Babesia equi* - 3,6 mg la 1 kg (echivalent cu 3 ml per 100 kg greutate corporală), se administrează - 4 injecții la interval de trei zile.

Câini (subcutanat sau intramuscular): babesioză - 3,6 - 6,0 mg la 1 kg greutate corporală (echivalentul a 0,3-0,5 ml la 10 kg greutate corporală), se administrează - 2 injecții la interval de o zi; dacă este necesar, se repetă după 14 zile la o doză de 0,2 ml la 10 kg greutate corporală, o dată.

Dacă se detectează boli parazitare ale sângelui la animalele adăpostite în grupuri, medicamentul se administrează întregului efectiv în doză profilactică. Se administrează o injecție repetată: după 6 săptămâni pentru bovine și după 4 săptămâni pentru alte specii de animale.

9. Recomandări privind administrarea corectă

Agitați bine flaconul înainte de utilizare.

10. Perioade de așteptare

Pentru carne de bovine și ovine 213 de zile de la ultima administrare a medicamentului; lapte de la bovine 7 zile. A nu se utiliza la ovinele de la care se obține lapte destinat consumului uman.

A nu se utiliza la cabaline destinate pentru consumul uman.

11. Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatură de la + 5°C până la + 25°C.

A se păstra în loc uscat, ferit de razele solare directe.

Nu utilizați acest medicament de uz veterinar după data expirării marcată pe etichetă după Exp. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Termenul de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 30 zile.

12. Precauții speciale pentru eliminare

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile care contribuie la protecția mediului.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar

Medicament de uz veterinar se eliberează cu prescripție.

14. Numerele certificatelor de înregistrare și dimensiunile ambalajelor

260012

15. Data ultimei revizuirii a prospectului

05/2026

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).

16. Date de contact

Deținătorul certificatului de înregistrare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

BROVAFARMA SRL

Bd. Nezavisimosti 18a, Brovary, Regiunea Kiev, 07400, Ucraina

Tel./Fax: +38 044 3300227;

E-mail: office@brovapharma.ua;

www.brovapharma.ua

Reprezentanți locali și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

SRL "ZooFarmAgro",

MD-2001, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Dacia 61H

Tel.: 022 855 073/069 827 427;

e-mail: zoofarmagro@mail.ru; www.zoofarmagro.md; www.zooshop.md

17. Alte informații

Codul ATCvet: QP51EX01