

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Imcar-120
soluție injectabilă

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

1 ml conține:

Substanța activă:

Dipropionat de imidocarb - 120,0 mg.

Excipienți:

Compoziția calitativă a excipienților și a altor constituenți	Compoziția cantitativă, dacă această informație este esențială pentru administrarea corectă a medicamentului de uz veterinar
Polivinilpirolidonă	10 mg
Alcool benzilic	11 mg
Acid propionic	4,5-6 EU
Apă înalt purificată	până la 1 ml.

3. INFORMAȚII CLINICE

3.1 Specii țintă

Bovine, ovine, cabaline (cai de sport), câini.

3.2 Indicații de utilizare pentru fiecare specie țintă

Prevenire și tratament:

- rumegătoare biongulate (bovine, ovine) – babesioză, teilerioză, anaplasmoză și invazii mixte;

- cabaline – babesioză, anaplasmoză și invazii mixte;

- câini – babesioză acută, cronică, subclinică și atipică, ehrlichioză, anaplasmoză și infestări mixte.

Chimioprofilaxia babesiozei - administrarea medicamentului imediat după detectarea unei căpușe atașate și la animalele cu risc (câini de vânătoare). Efectul protector durează 14-21 de zile după administrare.

3.3 Contraindicații

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

Nu se utilizează în decurs de 4 săptămâni de la vaccinarea cu un vaccin viu împotriva babesiozei sau anaplasmozei.

3.3 Atenționări speciale

Studii specifice privind utilizarea medicamentului la animale tinere nu au fost efectuate.

În aceste cazuri, poate fi utilizat numai conform indicațiilor medicului veterinar, dacă beneficiul așteptat pentru animalul respectiv depășește riscul de complicații.

3.5 Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

Agitați bine flaconul înainte de utilizare. Se recomandă utilizarea concomitentă de antihistaminice, conform instrucțiunilor de utilizare.

Din cauza unei posibile reacții dureroase, nu se recomandă administrarea în același loc mai mult de 10 ml la animalele mari și mai mult de 2 ml la animalele mici.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Personalul, care manipulează medicamentul Imcar 120, trebuie să respecte regulile generale de igienă personală și măsurile de siguranță prevăzute în lucrul cu medicamente de uz veterinar.

Persoanele cu hipersensibilitate la componentele produsului trebuie să evite contactul direct cu acesta.

În caz de contact accidental al medicamentului cu pielea sau mucoasele ochilor, acestea trebuie spălate cu multă apă. În caz de reacții alergice, reacții adverse sau în caz de ingerare accidentală a medicamentului, trebuie să contactați imediat o unitate medicală (să aveți la sine prospectul de utilizare a medicamentului sau eticheta).

Precauții speciale pentru protecția mediului:

Produsul Imcar 120 nu trebuie lăsat să pătrundă în apele de suprafață.

3.6 Evenimente adverse

În cazul când Imcar 120 este utilizat conform instrucțiunii, de regulă nu se observă evenimente adverse și complicații. În unele cazuri, pot apărea modificări localizate ale pielii (hiperemie, umflații dureroase) la locul injectării, dar aceste modificări dispar spontan. Dacă apar reacții alergice, întrerupeți utilizarea medicamentului și administrați terapie simptomatică.

Câinilor în cazul dezvoltării a reacțiilor adverse sau pentru a le preveni li se administrează atropină în doza terapeutică recomandată.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței medicamentului de uz veterinar. Rapoartele se trimit, de preferință prin medicul veterinar, fie deținătorului certificatului de înregistrare sau reprezentantului local al acestuia, fie Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor prin sistemul național de raportare. Consultați, de asemenea, secțiunea 16 din prospect pentru datele de contact respective.

3.7 Utilizarea în timpul gestației, lactației sau a ouatului

Studii specifice privind utilizarea medicamentului la animale gestante sau care alăptează nu au fost efectuate. În aceste cazuri, medicamentul poate fi utilizat numai conform indicațiilor medicului veterinar, dacă beneficiul așteptat pentru animalul respectiv depășește riscul de complicații pentru făt.

3.8 Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune

Nu utilizați simultan cu medicamente organoclorurate, organofosforice și alți inhibitori de colinesterază.

3.9 Căi de administrare și doze

Bovine (subcutanat):

- babesioză – 2,4 mg la 1 kg greutate corporală (echivalent cu 2 ml la 100 kg greutate corporală), o singură administrare;
- anaplasmoză – 3,0 mg la 1 kg greutate corporală (echivalent cu 2,5 ml la 100 kg greutate corporală), o singură administrare;
- infestări mixte – 2,5 ml la 100 kg greutate corporală, o singură administrare;
- profilaxie – 2,4 mg la 1 kg greutate corporală, o singură administrare;

Ovine (intramuscular): Babesioză - 2,4 mg la 1 kg greutate corporală (echivalent cu 0,2 ml per 10 kg greutate corporală), o singură administrare;

Cabaline (intramuscular):

- *Babesia caballi* - 2,4 mg la 1 kg greutate corporală (echivalent cu 2 ml per 100 kg greutate corporală), se administrează - 2 injecții la interval de o zi;
- *Babesia equi* - 3,6 mg la 1 kg (echivalent cu 3 ml per 100 kg greutate corporală), se administrează - 4 injecții la interval de trei zile.

Câini (subcutanat sau intramuscular): babesioză - 3,6 - 6,0 mg la 1 kg greutate corporală (echivalentul a 0,3-0,5 ml la 10 kg greutate corporală), se administrează - 2 injecții la interval de o zi; dacă este necesar, se repetă după 14 zile la o doză de 0,2 ml la 10 kg greutate corporală, o dată.

Dacă se detectează boli parazitare ale sângelui la animalele adăpostite în grupuri, medicamentul se administrează întregului efectiv în doză profilactică. Se administrează o injecție repetată: după 6 săptămâni pentru bovine și după 4 săptămâni pentru alte specii de animale.

Agitați bine flaconul înainte de utilizare.

3.10 Simptome de supradozaj (și, după caz, proceduri de urgență și antidoturi)

În caz de supradozaj, animalele pot prezenta bradicardie, complicații respiratorii, anorexie, salivare excesivă, vomă, lăcrimare, transpirații, tremurături musculare, urinare și defecație frecvente. În acest caz, animalul trebuie tratat simptomatic.

3.11 Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare, inclusiv restricții privind utilizarea medicamentelor de uz veterinar antimicrobiene și antiparazitare, pentru a limita riscul de dezvoltare a rezistenței

A se administra doar de către un medic veterinar.

3.12 Perioade de așteptare

Pentru carne de bovine și ovine 213 de zile de la ultima administrare a medicamentului; lapte de la bovine 7 zile. A nu se utiliza la ovinele de la care se obține lapte destinat consumului uman.

A nu se utiliza la cabaline destinate pentru consumul uman.

4. INFORMAȚII FARMACOLOGICE

4.1 Codul ATCvet: QP51EX01

4.2 Farmacodinamie

Dipropionatul de imidocarb este un derivat de icarbanilid. Are un spectru larg de activitate antiprotozoară împotriva agenților patogeni care provoacă piroplasmoză în infestări mono- sau mixte - *Babesia bovis*, *B. bigemina*, *B. colchica* (*Francaielliella colchica*), *B. divergens*, *B. ovis*, *B. motasi*, *B. caballi*, *B. equi* (*Nuttallia equi*), *B. canis*, *B. gibsonii*, *B. vogeli*, *Theileria* *Theileria annulata*, *T. sergenti*, *T. mutans*, *T. orientalis*, *T. ovis*, *T. recondita*, *T. hirci*, *T. tarandirangiferis*, rickettsia din genul *Anaplasma*: *Anaplasma marginale*, *A. centrale*, *A. ovis*, *A. phagocytophilum* și genul *Ehrlichia*: *Ehrlichia canis*, *E. chaffeensis*.

Mecanismul acțiunii antiprotozoare se bazează pe inhibarea procesului de metabolism aerob al glucozei și a sintezei ADN-ului piroplasmelor și rickettsiilor, ceea ce duce la moartea paraziților.

4.3 Farmacocinetică

După administrarea parenterală, medicamentul se absoarbe rapid și atinge concentrațiile sanguine maxime în 1-2 ore.

Este metabolizat într-o mică măsură, se acumulează în principal în rinichi și ficat și este eliminat din organism lent, în principal prin fecale, o cantitate mică fiind excretată în urină.

Imidocarb dipropionatul, în funcție de impactul său asupra organismului, este clasificat drept substanță moderat periculoasă (clasa de pericol 3 conform GOST 12.1.007-76).

5. INFORMAȚII FARMACEUTICE

5.1 Incompatibilități majore

Nu utilizați simultan cu medicamente organoclorurate, organofosforice și alți inhibitori de colinesterază.

5.2 Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate al medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 24 luni.
Termenul de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 30 zile.

5.3 Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.
A se păstra la temperatură de la + 5°C până la + 25°C.
A se păstra în loc uscat, ferit de razele solare directe.

5.4 Natura și compoziția ambalajului primar

Flacoane de sticlă, sigilate ermetic cu dopuri de cauciuc sub jante de aluminiu a câte 10 ml, 50 ml.

5.5 Precauții speciale pentru eliminarea medicamentului de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea acestor produse

Medicamentul nu trebuie eliminat în apele uzate sau deșeurile menajere.
Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile care contribuie la protecția mediului.

6. NUMELE DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

BROVAFARMA SRL
Bd. Nezavisimosti 18a, Brovary, Regiunea Kiev, 07400, Ucraina
Tel./Fax: +38 044 3300227;
E-mail: office@brovapharma.ua
www.brovapharma.ua

7. NUMĂRUL(NUMERELE) CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

260012

8. DATA PRIMEI ÎNREGISTRĂRI

27/05/2026

**9. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A REZUMATULUI CARACTERISTICILOR
MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR**

05/2026

10. CLASIFICAREA MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR

Medicament de uz veterinar se eliberează cu prescripție.

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).