

PROSPECTUL

1. Denumirea medicamentului de uz veterinar

Stop-coccid 2,5%.

2. Compoziție

1 ml conține:

Substanță activă:

Toltrazuril - 25 mg

Excipienți: trietanolamină, polietilenglicol-400.

Soluție orală. Soluție transparentă sau ușor opalescentă, de culoare de la galbenă pal până la galbenă.

3. Specii țintă

Găini (pui), curci.

4. Indicații de utilizare

Stop-coccid 2,5% se indică cu scop curativ și profilactic în cazul coccidiozei, când în așternut este atins un nivel critic de coccidii (10-20 mii/g) și în cazul apariției la păsări a simptomelor caracteristice ale bolii.

5. Contraindicații

A nu se administra păsărilor de prăsilă și tineretului de înlocuire, cu vârsta mai mare de 16 săptămâni.

6. Atenționări speciale

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

Particularități deosebite de acțiune a medicamentului la prima administrare sau în caz de anulare nu s-au stabilit.

Evitați încălcarea schemei de administrare prescrise a medicamentului de uz veterinar, deoarece acest lucru poate reduce eficacitatea terapeutică. În cazul omiterii unei doze se va recurge la reluarea dozei conform schemei de tratament.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu Stop-coccid 2,5% e important de respectat regulile generale de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.

După finisarea lucrului, spălați-vă pe mâini cu apă caldă și săpun.

Persoanelor cu hipersensibilitate se recomandă evitarea contactului direct cu medicamentul dat.

În caz de contact accidental cu pielea sau tunicile mucoase oculare, ele se spală din abundență cu apă.

În caz de ingerare sau apariție a reacțiilor alergice e necesar de adresat la o instituție medicală (cu sine de avut eticheta sau prospectul de utilizare).

Gestație și lactație:

A nu se utiliza la găinile ouătoare în timpul producției de ouă pentru consum uman.

Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune

Nu se recomandă administrarea concomitentă cu alte medicamente coccidiostatice.

Supradozare

În caz de supradozare se poate observa inapetență, se reduce consumul de apă și scăderea greutatei corporale.

Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare

Nu este cazul.

Incompatibilități majore

A nu se utiliza concomitent cu alte anticoccidiene.

7. Evenimente adverse

Reacții adverse sau complicații în urma administrării de regulă nu apar, când este utilizat conform prospectului de utilizare.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactați în mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimente adverse către deținătorul certificatului de înregistrare sau reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: mvnotificare@ansa.gov.md, tel. 022-210-156.

8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare

Stop-coccid 2,5% se administrează cu apă de băut, timp de două zile, în doză de 7 mg de toltrazuril/1 kg greutate corporală (28 ml medicament/100 kg greutate corporală), ceea ce este echivalent cu:

- 1 ml /1 litru apă de băut care se administrează timp de 48 de ore consecutive sau
- 3 ml/1 litru apă de băut care se administrează timp 8 ore pe zi, două zile consecutive.

9. Recomandări privind administrarea corectă

În cazuri grave, cura de tratament se repetă peste 5 zile.

Pe tot parcursul tratamentului e important ca pasărea să primească doar apă cu conținut de medicament.

Apa de băut medicamentată își păstrează acțiune timp de 48 de ore.

În caz de apariție a sedimentului, soluția înainte de utilizare bine se amestecă.

10. Perioade de așteptare

Găini (carne și organe)-14 zile.

Curci (carne și organe)-16 zile.

11. Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la vederea și îndemîna copiilor.

A se păstra în ambalajul original.

A se feri de lumină directă a soarelui.

A se păstra separat de produse alimentare și furaje

A se păstra la T°C de la 2°C până la 25°C.

Nu utilizați acest medicament de uz veterinar după data expirării marcată pe etichetă după Exp. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Termenul de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 60 zile.

12. Precauții speciale pentru eliminare

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile. Aceste măsuri ar trebui să contribuie la protecția mediului.

Solicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar

Medicament de uz veterinar care se eliberează cu prescripție.

14. Numerele certificatelor de înregistrare și dimensiunile ambalajelor

Stop-coccid^R 2,5% se ambalează în flacoane din polimer a câte 10 ml, 100 ml și 1 litru, cu capace filetate securizate din polimer.

Ambalaj secundar:

Flacoanele de 10 și 100 ml se ambalează individual în cutie de carton. Flacoanele de 1 litru se ambalează într-un ambalaj de transport. Se admite ambalarea flacoanelor de 10 ml în cutie din carton a câte 11 flacoane.

Fiecare ambalaj este însoțit de prospect de utilizare.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

15. Data ultimei revizuirii a prospectului

05/2026

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).

16. Date de contact

Deținătorul certificatului de înregistrare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

ООО „Apicenna”, Federația Rusă
143985, or. Moscova, r. Balașiha, șos. Poltevscoe nr. 4.
Tel.: +7(495)580-77-13

Reprezentanți locali și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

SRL „ZooFarmAgro”,
MD-2001, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Dacia 61-H
Te.: 022 855 073/069 827 427;
e-mail: zoofarmagro@mail.ru;
www.zoofarmagro.md; www.zooshop.md

17. Alte informații

Codul ATCvet: QP51BC01