

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Stop-coccid 2,5%.

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

1 ml conține:

Substanțe active:

Toltrazuril - 25 mg

Excipienți:

Compoziția calitativă a excipienților și a altor constituenți	Compoziția cantitativă, dacă această informație este esențială pentru administrarea corectă a medicamentului de uz veterinar
Trietanolamină	300 mg/ ml
Polietilenglicol-400	Până la 1 ml.

Soluție orală. Soluție transparentă sau ușor opalescentă, de culoare de la galbenă pal până la galbenă.

3. INFORMAȚII CLINICE

3.1 Specii țintă

Găini (pui), curci.

3.2 Indicații de utilizare pentru fiecare specie țintă

Stop-coccid 2,5% se indică cu scop curativ și profilactic în cazul coccidiozei, când în așternut este atins un nivel critic de coccidii (10-20 mii/g) și în cazul apariției la păsări a simptomelor caracteristice ale bolii.

3.3 Contraindicații

A nu se administra păsărilor de prăsilă și tineretului de înlocuire, cu vârsta mai mare de 16 săptămâni.

3.4 Atenționări speciale

Nu sunt.

3.5 Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă

Particularități deosebite de acțiune a medicamentului la prima administrare sau în caz de anulare nu s-au stabilit.

Evitați încălcarea schemei de administrare prescrise a medicamentului de uz veterinar, deoarece acest lucru poate reduce eficacitatea terapeutică. În cazul omiterii unei doze se va recurge la reluarea dozei conform schemei de tratament.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale

În timpul lucrului cu Stop-coccid 2,5% e important de respectat regulile generale de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.

După finisarea lucrului, spălați-vă pe mâini cu apă caldă și săpun.

Persoanelor cu hipersensibilitate se recomandă evitarea contactului direct cu medicamentul dat.

În caz de contact accidental cu pielea sau tunicile mucoase oculare, ele se spală din abundență cu apă.

În caz de ingerare sau apariție a reacțiilor alergice e necesar de adresat la o instituție medicală (cu sine de avut eticheta sau prospectul de utilizare).

3.6 Evenimente adverse

Reacții adverse sau complicații în urma administrării de regulă nu apar, când este utilizat conform prospectului de utilizare.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței medicamentului de uz veterinar. Rapoartele se trimit, de preferință prin medicul veterinar, fie deținătorului certificatului de înregistrare sau reprezentantului local al acestuia, fie Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor prin sistemul național de raportare. Consultați, de asemenea, secțiunea 16 din prospect pentru datele de contact respective.

3.7 Utilizare în timpul gestației, lactației sau a ouatului

A nu se utiliza la găinile ouătoare în timpul producției de ouă pentru consum uman.

3.8 Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune

Nu se recomandă administrarea concomitentă cu alte medicamente coccidiostatice.

3.9 Căi de administrare și doze

Stop-coccid 2,5% se administrează cu apa de băut, timp de două zile, în doză de 7 mg de toltrazuril/1 kg greutate corporală (28 ml medicament/100 kg greutate corporală), ceea ce este echivalent cu:

- 1 ml /1 litru apă de băut care se administrează timp de 48 de ore consecutive sau
- 3 ml/1 litru apă de băut care se administrează timp 8 ore pe zi, două zile consecutive.

În cazuri grave, cura de tratament se repetă peste 5 zile.

Pe tot parcursul tratamentului e important ca pasărea să primească doar apă cu conținut de medicament.

Apa de băut medicamentată își păstrează acțiune timp de 48 de ore.

În caz de apariție a sedimentului, soluția înainte de utilizare bine se amestecă.

3.10 Simptome de supradozaj (și după caz, proceduri de urgență și antidoturi)

În caz de supradozare se poate observa inapetență, se reduce consumul de apă și scade greutatea corporală.

3.11 Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare, inclusiv restricții privind utilizarea medicamentelor de uz veterinar antimicrobiene și antiparazitare, pentru a limita riscul de dezvoltare a rezistenței

Nu este cazul.

3.12 Perioada de așteptare

Găini (carne și organe)-14 zile.

Curci (carne și organe)-16 zile.

4. INFORMAȚII FARMACOLOGICE

4.1 Codul ATCvet: QP51BC01

4.2 Farmacodinamie

Toltrazuril - este un derivat de triazintrionă, posedă un larg spectru de acțiune coccidiocidă asupra tuturor stadiilor intracelulare de dezvoltare (merogonii și gamogonii) a coccidiilor (eimerelor) care parazitează la păsări, inclusiv *Eimeria acervulina*, *Eimeria brunetti*, *Eimeria necatrix*, *Eimeria mitis*, *Eimeria adenoides*, *Eimeria meleagridis*, *Eimeria anseris*, *Eimeria truncata* și cele rezistente la alte medicamente anticoccidiene.

Mecanismul de acțiune a toltrazurilului constă în blocarea enzimelor respiratorii și acțiunea distrugătoare asupra mitocondriilor și proceselor de divizare a nucleului coccidiei. Toltrazurilul, deregând procesul de formare a macrogameților provoacă moartea parazitului.

4.3 Farmacocinetica

În urma administrării per orale a medicamentului, toltrazurilul este lent absorbit și oferă acțiune coccidiocidă în tunicile mucoasă și submucoasă a tractului digestiv.

Este excretat practic nemodificat dar și sub formă de metaboliți cu excremente.

După gradul de impact asupra organismului, face parte din substanțele cu pericol scăzut (clasa de pericol 4 conform GOST 12.1.007-76).

5. INFORMAȚII FARMACEUTICE

5.1 Incompatibilități majore

A nu se utiliza concomitent cu alte anticoccidiene.

5.2 Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate al medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani.

Termenul de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 60 zile.

5.3 Precauții speciale pentru depozitare

A se păstra în ambalajul original.

A se feri de lumină directă a soarelui.

A se păstra separat de produse alimentare și furaje

A se păstra la T°C de la 2°C până la 25°C.

A nu se lăsa la vederea și îndemîna copiilor.

5.4 Natura și compoziția ambalajului primar

Stop-coccid^R 2,5% se ambalează în flacoane din polimer a câte 10 ml, 100 ml și 1 litru, cu capace filetate securizate din polimer.

Ambalaj secundar:

Flacoanele de 10 și 100 ml se ambalează individual în cutie de carton. Flacoanele de 1 litru se ambalează într-un ambalaj de transport. Se admite ambalarea flacoanelor de 10 ml în cutie din carton a câte 11 flacoane.

Fiecare ambalaj este însoțit de prospect de utilizare.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

5.5 Precauții special pentru eliminarea medicamentului de uz veterinar neutilizat sau a deșeurilor provenite din utilizarea acestor produse

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu sistemele de colectare aplicabile medicamentului de uz veterinar respectiv.

6. NUMELE DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

OOO „Apicenna”, Federația Rusă

143985, or. Moscova, r. Balașiha, șos. Poltevscoe nr. 4.

Tel.: +7(495)580-77-13

7. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

260013

8. DATA PRIMEI ÎNREGISTRĂRI

27/05/2026

9. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A REZUMATULUI CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

05/2026

APROBAT

10. CLASIFICAREA MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR

Medicament de uz veterinar care se eliberează cu prescripție.

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în baza de date a Republicii Moldova-Registru de Stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).