

## PROSPECTUL

### 1. Denumirea medicamentului de uz veterinar

ASD®-10  
aerosol pentru uz extern

### 2. Compoziție

100 ml de produs conține:

**Substanța activă:**

100 ml de produs conține:

Substanță ASD-2F - 5 g;

Substanță ASD-3F - 5 g.

**Excipienți:** propulsor cu azot și izopropanol.

Soluție de culoare de la brună până la neagră, cu miros specific.

### 3. Specii țintă

Bovine, ovine, caprine, cabaline, porcine, păsări.

### 4. Indicații de utilizare

ASD®-10 este prescris bovinelor, ovinelor, caprinelor, cailor, porcilor și păsărilor de curte pentru tratamentul rănilor proaspete de origine traumatică și chirurgicală, dermatitelor, bolilor inflamatorii cronice ale pielii, ulcerelor trofice, fistulelor, rănilor purulente, bolilor copitelor, necrobacteriozei și pentru prevenirea și tratamentul wohlfahrtiozei.

### 5. Contraindicații

Contraindicația pentru utilizare este sensibilitatea individuală crescută a animalului la componentele medicamentului (inclusiv în anamneză).

### 6. Atenționări speciale

#### Atenționări speciale:

Din cauza mirosului său specific, nu se recomandă aplicarea produsului pe glandele mamare ale animalelor care alăptează, al căror lapte este utilizat pentru consumul uman.

Medicamentul este permis pentru utilizare la animale tinere.

#### Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:>

Particularități deosebite de acțiune a medicamentului la prima administrare sau în caz de anulare nu s-au stabilit.

Evitați încălcarea schemei de administrare prescrise a medicamentului de uz veterinar, deoarece acest lucru poate reduce eficacitatea terapeutică. În caz dacă se omite o administrare, tratamentul trebuie reluat cât mai curând posibil, în aceeași doză, conform aceeași scheme.

#### Precauții speciale care vor fi luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Când lucrați cu acest produs, respectați măsurile generale de igienă personală și măsurile de siguranță pentru manipularea medicamentelor de uz veterinar. Se recomandă purtarea mănușilor de cauciuc și a unui aparat respirator atunci când efectuați tratamente și proceduri profilactice cu ajutorul acestui produs. Persoanele cu hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului trebuie să evite contactul direct cu ASD®-10. După terminarea lucrului, spălați-vă pe mâini cu apă caldă și săpun.

În caz de contact accidental a medicamentului de uz veterinar cu pielea sau cu tunicile mucoase oftalmice, trebuie de spălat acestea din abundență cu apă.

În caz de apariție a reacției alergice sau la ingerare accidentală, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.

Precauții speciale pentru protecția mediului:

Produsul ASD®-10 nu trebuie lăsat să pătrundă în apele de suprafață.

Alte precauții:

Recipientele goale ale medicamentelor nu trebuie dezamblate sau incinerate.

Gestație și lactație:

Medicamentul este permis pentru utilizare la animale gestante și care alăptează.

Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Utilizarea medicamentului nu exclude utilizarea altor medicamente de uz veterinar pentru terapia etiotropă, patogenetică și simptomatică, cu excepția medicamentelor pentru uz local, din cauza unei posibile scăderi a eficacității acestora.

Supradozare:

Simptome de supradozaj nu sa-au înregistrat.

Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare:

Nu este cazul.

Incompatibilități majore:

Nu se recomandă utilizarea cu alte preparate la nivel local al plăgilor.

**7. Evenimente adverse**

Când este utilizat conform acestor instrucțiuni, în general nu se observă evenimente adverse și complicații.

În cazul unei sensibilități individuale crescute la medicament și al apariției reacțiilor alergice, utilizarea acestuia este întreruptă, iar animalului i se prescriu antihistaminice și alte terapii simptomatice.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactați în mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimente adverse către deținătorul certificatului de înregistrare sau reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: mvnnotificare@ansa.gov.md, tel. 022-210-156.

**8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare**

ASD®-10 se aplică extern animalelor pe pielea deteriorată, copite, acoperind 2-3 cm de piele sănătoasă (pentru a preveni răspândirea inflamației). Înainte de aplicare a produsului, se recomandă tratarea chirurgicală a zonei afectate, curățarea acesteia de puroi, exudatul plăgii, țesutul necrotic și îndepărtarea părului.

Înainte de utilizare, agitați bine recipientul timp de câteva secunde și, ținând recipientul vertical, pulverizați de la o distanță de 15-20 cm de zona afectată, distribuind uniform pe suprafață. După utilizare, întoarceți recipientul cu susul în jos și apăsați scurt duza de pulverizare până când se eliberează aer (pentru a curăța duza de pulverizare).

În cazul ciugulirii păsărilor și pentru prevenirea infecțiilor a rănilor în timpul castrării și tăierii cozii, marcarea, crotaliere, decornării, abraziunilor, crăpăturilor, tăieturilor pielii după tuns, produsul se aplică o singură dată pe zonele afectate.

*Pentru tratamentul rănilor proaspete, arsurilor, eczemelor, dermatitei și altor boli inflamatorii ale pielii, aerosolul se aplică pe zonele afectate o dată pe zi. Tratamentul se administrează zilnic sau la fiecare 2-3 zile până la recuperarea animalului, dar nu mai mult de 7 zile.*

*În cazurile de canibalism la porci, aerosolul se aplică pe zona afectată o dată pe zi până la recuperarea animalului, dar nu mai mult de 7 zile.*

*În terapia combinată pentru infecții purulente ale pielii (piodermie, leziuni inflamatorii cronice ale pielii, ulcere trofice și ulcere de decubit), după curățarea și tratamentul adecvat, aerosolul se aplică pe zonele afectate ale pielii o dată pe zi până la recuperarea animalului, dar nu mai mult de 8 zile. Tratamentul se efectuează în combinație cu medicamente specifice și simptomatice.*

*Sau în monoterapie cu complexul ASD: ASD-3F - Antiseptic-stimulator Dorogov fracția 3 în aerosol se aplică pe zonele afectate ale pielii o dată pe zi până la încetarea eliminării a exudatului purulent, dar nu mai mult de trei zile. Tratamentul se continuă apoi cu produsul ASD®-10 o dată pe zi până la recuperarea animalului, dar nu mai mult de patru zile.*

*Pentru tratamentul bolilor și leziunilor purulente necrotice, inclusiv ale copitelor, inclusiv pododermatită, necrobacterioză, răni și inflamații purulente ale benzii coronare, tălpii, gleznei și cavități în broasca copitei, după curățarea și tratamentul adecvat zonele afectate sunt irigate cu aerosol o dată pe zi, timp de 7-14 zile, până la recuperarea animalului. Tratamentul se efectuează în combinație cu proceduri chirurgicale locale și medicație specifică și simptomatică.*

*Sau, ca monoterapie cu complexul ASD: ASD-3F Antiseptic-stimulator Dorogov fracția 3 în aerosol, se aplică pe zonele afectate ale extremităților o dată pe zi, până la încetarea eliminării a exudatului purulent, dar nu mai mult de trei zile. Tratamentul se continuă apoi cu ASD®-10 o dată pe zi, până la recuperarea animalului, dar nu mai mult de 11 zile.*

*Pentru prevenirea și tratamentul Wohlfahrtiozei, produsul se aplică pe rănilor proaspete, precum și pe cele infestate cu muște Wohlfahrtia, fără a le curăța sau a îndepărta larvele. Rănilor se tratează o singură dată; în timp ce rănilor cu vindecare lentă se tratează de două ori, la un interval de 48 de ore. Larvele moarte se îndepărtează de pe rană la o oră după tratament.*

## **9. Recomandări privind administrarea corectă**

Înainte de utilizare recipientul cu aerosol trebuie păstrat la o temperatură de 15-25°C timp de cel puțin 5-6 ore. Animalele trebuie tratate în aer liber sau într-o zonă bine ventilată.

## **10. Perioade de așteptare**

Carne, organe, lapte, ouă: zero zile.

În cazul sacrificării forțate a unui animal, zonele tratate ale carcasei se curăță și se elimină.

## **11. Precauții speciale pentru depozitare**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatură de la +2°C până la +25°C.

A se păstra ferit de razele solare directe, de dispozitivele de încălzire și flăcările deschise.

Nu utilizați acest medicament de uz veterinar după data expirării marcată pe etichetă după Exp. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Termenul de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: până la finele perioadei de valabilitate.

## **12. Precauții speciale pentru eliminare**

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile care contribuie la protecția mediului.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

**13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar**

Medicament de uz veterinar se eliberează fără prescripție.

**14. Numerele certificatelor de înregistrare și dimensiunile ambalajelor**

260014

Flacoane metalice de 150 ml, cu adaptor de pulverizare și capace din polimer. Fiecare cutie pentru consumatori este însoțită de instrucțiuni de utilizare.

**15. Data ultimei revizuiți a prospectului**

05/2026

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).

**16. Date de contact**

Deținătorul certificatului de înregistrare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

SRL "Agrovetzashchita" S-L  
Federația Rusă, 141305, Regiunea Moscova, r-l Serghiev Posad,  
Strada Centralnaya, bloc 1/11

Reprezentanți locali și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

Republica Moldova  
SRL "ZooFarmAgro",  
MD-2001, mun. Chișinău, bd. Dacia 61H  
Tel.: 022 855 073/069 827 427;  
e-mail: zoofarmagro@mail.ru; [www.zoofarmagro.md](http://www.zoofarmagro.md); [www.zooshop.md](http://www.zooshop.md)

**17. Alte informații**

Codul ATCvet: QD08