

PROSPECTUL

1. Denumirea medicamentului de uz veterinar

MaxiDrops, pentru pisici 1-4 kg, soluție pentru uz extern

MaxiDrops, pentru pisici 4-8 kg, soluție pentru uz extern

MaxiDrops, pentru câini >5-10 kg, soluție pentru uz extern

MaxiDrops, pentru câini 10-20 kg, soluție pentru uz extern

MaxiDrops, pentru câini 20-40 kg, soluție pentru uz extern

2. Compoziție

1 ml conține:

Substanța activă:

Pentru pisici: fipronil -80 mg, praziquantel -68 mg, moxidectină -8 mg și diflubenzuron -1 mg.

Pentru câini: fipronil -100 mg, praziquantel -85 mg, moxidectină -25 mg, diflubenzuron -1 mg;

Excipienți: butilhidroxianisol, metilpirolidonă, ulei esențial de lavandă, ulei de neem, monoetil eter de dietilen glicol.

3. Specii țintă

Câini, pisici.

4. Indicații de utilizare

MaxiDrops este prescris câinilor și pisicilor (adulti și tineri) pentru tratamentul și prevenirea bolilor parazitare asociate cauzate de purici, căpușe Ixodida, păduchi, acarienii scabiei și Trombidiformes, nematode și cestode, pentru prevenirea dirofilariozei cauzate de larvele de *Dirofilaria immitis* și *Dirofilaria repens*, precum și pentru reducerea riscului de infecție cu babesioză și borelioză, care sunt transmise de căpușele Ixodida.

5. Contraindicații

Contraindicațiile pentru utilizarea MaxiDrops includ hipersensibilitate la oricare dintre componentele medicamentului (inclusiv în anamneză), epuizare, epilepsie, boli infecțioase, hipertermie și disfuncții hepatice și renale.

Nu se administrează la animale din alte specii, inclusiv câini cu greutatea mai mică de 2 kg și pisici cu greutatea mai mică de 1 kg și/sau la animale cu vârsta sub 7 săptămâni.

Acest produs nu trebuie administrat câinilor din rase cunoscute ca fiind sensibile la lactone macrociclice, inclusiv Ciobănescul australian (Aussie), Ciobănesc alb, Bobtail (ciobănesc englezesc vechi), Border Collie, Collie cu păr scurt, Collie cu păr lung, McNab Collie, Whippet cu păr lung, Silky Windhounds, Ciobănesc de Shetland și metișii acestora.

Acest produs nu trebuie administrat pisicilor sau câinilor cu hipersensibilitate condiționată genetic (deficiență MDR1).

6. Atenționări speciale

Atenționări speciale:

A nu se administra animalelor productive.

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

Evitați ca animalul să lingă produsul. Pentru a preveni linsul, puneți animalului un guler de protecție sau o botniță, îndepărtând-o la 20-30 de minute după aplicare.

Particularitățile acțiunii în caz de administrare pentru prima dată și în caz de anulare a medicamentului nu sunt stabilite.

Pe blana animalului poate fi observată o pată albicioasă umedă sau uleioasă timp de 24 ore după administrarea medicamentului.

Precauții speciale care vor fi luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Când lucrați cu MaxiDrops, respectați măsurile generale de igienă personală și măsurile de siguranță privind manipularea medicamentelor de uz veterinar.

În timpul efectuării procedurilor de tratament sau profilaxie cu medicament se recomandă purtarea mănușilor de cauciuc.

Persoanele cu hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului trebuie să evite contactul direct cu MaxiDrops.

După finisarea lucrului, spălați-vă bine pe mâini cu apă caldă și săpun.

Evitați să mângâiați animalul sau să-l lăsați în apropierea copiilor mici timp de 24 de ore după tratament.

În caz de contact accidental al medicamentului cu pielea sau mucoasele, în caz de contact cu ochii, îndepărtați-l imediat cu un tampon și apoi clătiți cu multă apă.

Dacă apare o reacție alergică sau dacă medicamentul este ingerat accidental, solicitați imediat asistență medicală (având la dumneavoastră prospectul de utilizare sau eticheta).

Precauții speciale pentru protecția mediului:

Produsul MaxiDrops nu trebuie lăsat să pătrundă în apele de suprafață.

Alte precauții:

Este toxic pentru iepuri, albini, pești și alți hidrobionți.

Gestație și lactație:

Este interzisă utilizarea medicamentului la pisici și cățele în timpul gestației și alăptării.

Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

MaxiDrops nu trebuie utilizat concomitent cu și/sau în decurs de 6 săptămâni de la ultima administrare de medicamente care conțin lactone macrociclice (milbemicină, moxidectină, abamectin, avermectină, doramectin, ivermectină, selamectină și eprinomectin), inhibitori de colinesterază și piperazină. Nu există informații privind incompatibilitatea medicamentului cu medicamente din alte grupuri farmacologice și aditivi pentru hrana animalelor.

Supradozare:

În cazul supradozării la animal pot fi observate anorexie, vărsături, diaree, salivă crescută, discoordonare motorie, stare depresivă, midriază, tremurături musculare, convulsii, hipersensibilitate la iritanți, alte simptome neurologice. În acest caz medicamentul trebuie spălat cu apă și detergent și trebuie prescrisă o terapie simptomatică. Nu există remedii specifice de detoxifiere, se utilizează măsuri generale care vizează eliminarea medicamentului din organism.

Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare:

Nu este cazul.

7. Evenimente adverse

Reacțiile adverse și complicațiile asociate cu utilizarea MaxiDrops în conformitate cu instrucțiuni de utilizare, de regulă nu sunt observate. În cazuri rare, la locul aplicării pot apărea modificări cutanate localizate, spontan tranzitorii (decolorare, alopecie, mâncărime, eritem). În cazul de lingere a produsului, pot apărea salivă crescută, vărsături, refuz de hrană, discoordonare motorie, depresie, midriază, tremurături

musculare, hipersensibilitate la iritanți și alte simptome neurologice. Dacă animalul prezintă o sensibilitate individuală crescută la componentele medicamentului și apar complicații, medicamentul se spală cu apă și detergent și se prescrie o terapie simptomatică și desensibilizantă.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactați în mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimente adverse către deținătorul certificatului de înregistrare sau reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: mvnotificare@ansa.gov.md, tel. 022-210-156.

8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare

MaxiDrops se administrează individual, o singură dată, prin aplicarea de picături pe pielea uscată și intactă. Despărțiți blana, plasați vârful tubului direct peste piele în zonele inaccesibile animalului pentru lins. Aplicați soluția pe piele în mai multe puncte de-a lungul coloanei vertebrale (de la urechi până la zona dintre omoplați și de-a lungul spatelui), evitând contactul cu blana.

Pentru câinii cu greutatea de până la 20 kg și pisicile, produsul se aplică pe piele în 2-4 puncte, pentru câinii cu greutatea peste 20 kg, în 4-6 sau mai multe puncte.

În funcție de tipul și greutatea animalului tratat, selectați dimensiunea și volumul tubului corespunzător conform tabelului:

Greutatea corporală, (kg)	Doza pentru tratament (ml)	Cantitatea de tuburi, buc./volumul tubului, ml pentru tratarea animalelor
Modificații pentru pisici		
> 1 - 4	0,5	1/0,5
> 4 - 8	1	1/1,0 sau 2/0,5
Modificații pentru câini		
> 5-10	1 ml	1/1,0
> 10-20	2 ml	1/2,0 sau 2/1,0
> 20-40	4 ml	1/4,0 sau 2/2,0 sau 4/1,0

Doza terapeutică minimă a medicamentului este de 0,1 ml/kg greutate corporală pentru câini și de 0,125 ml/kg greutate corporală pentru pisici, ceea ce echivalează cu 10 mg/kg de fipronil, 2,5 mg/kg de moxidectină pentru câini, 1 mg/kg de moxidectină pentru pisici, 8,5 mg/kg de praziquantel și 0,1 mg/kg de diflubenzuron.

Pentru tratarea pisicilor cu greutatea peste 8 kg, se utilizează o combinație de tuburi, bazată pe o doză de 1 ml de medicament pentru fiecare 4 kg greutate corporală.

Pentru tratarea câinilor cu greutatea peste 60 kg, se utilizează o combinație de tuburi, bazată pe o doză de 1 ml de medicament pentru fiecare 10 kg greutate corporală.

Pentru a asigura o protecție optimă împotriva căpușelor, produsul trebuie aplicat cu cel puțin 24 de ore înainte de data estimată pentru plimbarea animalului în zonele în care pot fi prezente căpușe (parcuri, piețe, păduri).

Se recomandă tratarea tuturor câinilor și pisicilor adăpostite în aceeași încăpere, în același timp.

Nu spălați și nu îmbăiați animalele cu șampon și nu le lăsați în ape naturale timp de 48 de ore înainte și 24 de ore după tratament. Îmbăierea ulterioară a animalului fără detergent nu afectează durata de eficacitate a produsului.

Tratamentele repetate se efectuează la animale, conform indicațiilor, dar nu mai mult de o dată pe lună, pe parcursul întregului sezon de ectoparaziți.

Pentru a preveni reapariția puricilor, înlocuiți așternutul animalelor sau tratați așternutul și podelele din încăperile cu un insecticid, conform instrucțiunilor de utilizare.

Pentru a ucide căpușele ixodide de pe un animal, aplicați o picătură de medicament pe căpușă și pe locul unde s-a atașat de piele. Dacă căpușa nu cade spontan în 20-30 de minute, îndepărtați-o cu grijă cu o pensetă și distrugeți-o.

Pentru a trata otodectoză (acarienii auriculari), urechile și canalul auditiv se curăță mai întâi de cerumen, exudat și cruste, apoi se picură 4-6 picături de medicament în fiecare ureche. Pentru a distribui uniform medicamentul, îndoiți urechea de-a lungul și masați ușor baza acesteia. Restul de medicament din tub se aplică pe pielea dintre omoplații animalului. Medicamentul trebuie administrat în ambele urechi, chiar dacă este afectată doar una dintre ele. Pentru a preveni stropirea cu medicament (dacă animalul clatină din cap), capul animalului trebuie imobilizat timp de câteva minute.

Tratamentul pentru demodectoză, sarcoptoză, otoacarioză și notoedroză este recomandat ca o combinație de medicație simptomatică și patogenetică. Pentru formele generalizate ale bolii, tratamentul se repetă de 2-3 ori la intervale de 4 săptămâni până când recuperarea este confirmată prin examen acarologic.

Pentru helmintiaze gastrointestinale, deparazitarea se efectuează conform indicațiilor, dar nu mai mult de o dată pe lună.

Pentru a preveni dirofilarioza în regiunile predispuse la boli, produsul se utilizează în timpul sezonului de țânțari, primăvara, vara și toamna. Aplicarea începe cu o lună înainte de începerea sezonului de țânțari, apoi în fiecare lună până la sfârșitul sezonului. Tratamentul final se administrează la o lună după sfârșitul sezonului de activitate a țânțarilor.

9. Recomandări privind administrarea corectă

Consultați prospectul înainte de utilizare.

10. Perioade de așteptare

Nu este cazul.

11. Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

A se păstra în ambalajul original.

A se păstra la temperatură de la +2°C până la +25°C.

A se păstra ferit de razele solare directe.

Nu utilizați acest medicament de uz veterinar după data expirării marcată pe etichetă după Exp. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

12. Precauții speciale pentru eliminare

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile care contribuie la protecția mediului.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar

Medicament de uz veterinar se eliberează cu prescripție.

14. Numerele certificatelor de înregistrare și dimensiunile ambalajelor

Medicamentul este ambalat în tuburi polimerice de unică folosință de 0,5; 1; 2; 4 și 6 ml, ambalate în cutii de carton a câte 1, 2 sau 3 tuburi.

Este permisă ambalarea individuală a tuburilor în pungi polimerice înainte de plasarea în cutii de carton. Fiecare ambalaj destinat consumatorilor este însoțit de instrucțiuni de utilizare.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

15. Data ultimei revizuirii a prospectului

06/2026

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).

16. Date de contact

Deținătorul certificatului de înregistrare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

SRL "Agrovetzashchita" S-L

Federația Rusă, 141305,

Regiunea Moscova, or. Sergiev Posad,

Strada Tsentralnaya, bloc 1/11

Reprezentanți locali și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

Republica Moldova

SRL "ZooFarmAgro", MD-2001, mun. Chișinău, bd. Dacia 61H

022 855 073/069 827 427;

e-mail: zoofarmagro@mail.ru; www.zoofarmagro.md; www.zooshop.md

17. Alte informații

Codul ATCvet: QP53AX15 - fipronil, QP52AA01 - praziquarfel, QP54AB02 - moxidectin, QP53BCO2 - diflubenzuron

