

PROSPECTUL

1. Denumirea medicamentului de uz veterinar

Alergostop
suspensie pentru administrare orală

2. Compoziție

1 ml conține:

Substanțe active:

Triamcinolonă - 1 mg;
Clorhidrat de piridoxină - 2 mg;
Riboflavină - 4 mg;
Nicotinamidă - 10 mg;
Metionină - 20 mg;

Excipienți: acid succinic, carboximetil celuloză, sare de sodiu, polisorbat (Tween-80), benzoat de sodiu, glicerină.

3. Specii țintă

Câini, pisici.

4. Indicații de utilizare

Tratamentul câinilor și pisicilor cu afecțiuni alergice ale pielii (urticarie, dermatită alergică, neurodermatită, eczeme, dermatită atopică, alopecie, înțepături de insecte), inclusiv cele complicate de infecții bacteriene.

5. Contraindicații

Nu se utilizează la animale cu hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului.
Nu se utilizează la femele gestante și care alăptează, sau la pisoi și căței cu vârsta sub 8 săptămâni.

6. Atenționări speciale

Atenționări speciale:

Nu se recomandă utilizarea la animale cu diabet zaharat sau infecții virale.

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

Nu sunt.

Precauții speciale care vor fi luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

La utilizarea medicamentului, este necesar să se respecte regulile generale de igienă personală și măsurile de siguranță prevăzute la lucrul cu medicamente veterinare.

Precauții speciale pentru protecția mediului:

Medicamentul de uz veterinar nu trebuie lăsat să pătrundă în apele de suprafață.

Gestație și lactație:

Nu se utilizează la femele gestante și care alăptează.

Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu se recomandă utilizarea simultană cu alte medicamente care conțin hormoni corticosteroizi.

Supradozare:

Administrarea orală a medicamentului în dozele recomandate nu a provocat apariția simptomelor de supradozaj.

Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare:

Nu este cazul.

7. Evenimente adverse

Când medicamentul este utilizat conform prospectului, în general nu se observă reacții adverse și complicații la animale. La unele animale cu sensibilitate individuală crescută la componentele medicamentului, pot apărea depresie, salivăție și tulburări gastrointestinale.

În astfel de cazuri, utilizarea medicamentului este întreruptă și, dacă este necesar, sunt prescrise tratamente simptomatice.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactați în mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimente adverse către deținătorul certificatului de înregistrare sau reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: mvnotificare@ansa.gov.md, tel. 022-210-156.

8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare

Suspensia Alergostop se administrează animalelor pe cale orală, individual în timpul hrănirii de dimineață cu o cantitate mică de hrană sau prin administrare forțată la rădăcina limbii folosind o seringă dozatoare, în dozele indicate în tabel:

Specia	Greutatea corporală, kg	Doza zilnică pentru un animal, ml
Pisici	1-3	0,25
	3 și mai mult	0,5
Câini	Până la 10	0,5
	10-20	1,0
	20-30	1,5
	30-40	2,0
	Mai mult de 40	2,0

9. Recomandări privind administrarea corectă

Agitați bine flaconul cu suspensie înainte de utilizare! În primele 4 zile de tratament, se utilizează doza indicată în tabel, iar în următoarele 8 zile, doza se înjumătățește (1/2 din doza terapeutică). Tratamentul poate fi prelungit la indicația medicului veterinar.

10. Perioade de așteptare

Nu este cazul.

11. Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatură de la 0°C la + 25°C.

A se feri de lumină, păstrat în loc uscat.

Termen de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 24 luni.

12. Precauții speciale pentru eliminare

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile care contribuie la protecția mediului.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar

14. Numerele certificatelor de înregistrare și dimensiunile ambalajelor

Flacoanele din polimer și/sau sticlă de 10 ml și 15 ml sunt ambalate în cutii de carton.

În cutie este inclusă și o seringă de unică folosință.

15. Data ultimei revizuirii a prospectului

06.2025

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).

16. Date de contact

Deținătorul certificatului de înregistrare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Întreprindere Individuală „O.L.KAR-AgroZooVet-Service”

str. Gheroev Maidana (Lenin), 272V, Shargorod, regiunea Vinnitsa, Ucraina, 23500

tel.: (043) 442-12-54, fax: (043) 442-17-87,

e-mail: vet@olkar.com.ua, www.agroolkar.com.ua

Reprezentanți locali și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

Republica Moldova

SA „Farmavet”, MD-2059, mun. Chișinău, str. Petricani 198.

Tel.: 31-72-70; 31-72-67; 99-92-89; Fax: 31-72-68;

www.farmavet.md

17. Alte informații

Codul ATC veterinar: QD07XB

