

PROSPECTUL

1. Denumirea medicamentului de uz veterinar

Fluralaner 1%, soluție orală

2. Compoziție

1 ml conține:

Substanță activă:

Fluralaner - 10 mg

Excipienți: Polisorbitat-80 10g, apă purificată până la 1ml.

3. Specii țintă

Păsări (pui, găini de curte, găini ouătoare, găini pentru reproducție).

4. Indicații de utilizare

Pentru tratamentul infestațiilor cu acarianii roșii la pui, găinile de curte, găinile ouătoare și găinile de reproducție.

5. Contraindicații

Nu există.

6. Atenționări speciale

Atenționări speciale:

Utilizarea inutilă de antiparazitare sau utilizarea care se abate de la instrucțiunile date poate crește presiunea de selecție a rezistenței și poate duce la o eficacitate redusă. Decizia de utilizare a produsului trebuie să se bazeze pe confirmarea speciilor de paraziți și a incarcaturii sau a riscului de infestare pe baza caracteristicilor epidemiologice ale fiecărui efectiv.

Următoarele practici trebuie evitate deoarece acestea cresc riscul de dezvoltare a rezistenței și în final poate rezulta o terapie inefficientă:

- utilizarea prea frecventă și repetată a acaricidelor din aceeași clasă o perioadă prea lungă de timp,
- subdozarea, care poate fi rezultat al unei estimări greșite a greutatei corporale, administrarea greșită a produsului, lipsa calibrării dispozitivului pentru măsurarea volumului.

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

Trebuie luate măsuri de biosecuritate pentru a preveni reinfectarea păsărilor de curte tratate. Pentru a garanta controlul pe termen lung al infectării parazitare în încăperea tratată, medicamentul trebuie administrat în același timp și puilor care urmează să crească, dacă este necesar.

Intervalul de dozare al acestui produs nu trebuie să fie mai mic de 3 luni.

Precauții speciale care vor fi luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Acest produs este ușor iritant pentru piele și/sau ochi și trebuie evitat contactul cu pielea, ochii și mucoasele. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul administrării medicamentului.

Imediat după contactul cu ochii, clătiți bine cu apă.

După utilizarea produsului, îndepărtați hainele contaminate și spălați-vă pe mâini și piele cu apă și săpun.

Precauții speciale pentru protecția mediului:

Apa de băut medicamentată nu trebuie să intre în apele de suprafață.

Păsări ouătoare:

Produsul poate fi utilizat în timpul perioadei de ouat.

Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu se recomandă utilizarea prin rotație a unor medicamente similare, cum ar fi Fluralaner.

Supradozare:

Găinile adulte și puii în vârstă de 3 săptămâni tratați cu o doză de 5 ori mai mare decât doza recomandată, timp de 3 ori durata de administrare recomandată, nu au prezentat reacții toxice; găinile ouătoare tratate cu o doză de 5 ori mai mare decât doza recomandată, timp de 3 ori durata de administrare recomandată, nu au prezentat efecte adverse asupra producției de ouă; găinile de reproducție tratate cu o doză de 3 ori mai mare decât doza recomandată, timp de 2 ori durata de administrare recomandată, nu au prezentat efecte adverse asupra performanței reproductive.

Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare:

Nu se aplică.

Incompatibilități majore:

În lipsa studiilor de compatibilitate, acest medicament de uz veterinar nu trebuie amestecat cu alte medicamente de uz veterinar.

7. Evenimente adverse

Nu se cunosc.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactați în mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimente adverse către deținătorul certificatului de înregistrare sau reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: mvnotificare@ansa.gov.md, tel.: 022-210-156.

8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare

Pentru administrare în apa de băut.

Soluția de preparat: 0,05 ml per 1 kg greutate corporală de pui (echivalent cu 0,5 mg de Fluralaner per 1 kg greutate corporală), administrată o dată la 7 zile, de 2 ori.

Doza zilnică (ml/zi) = greutatea corporală totală a puilor care urmează să fie tratați (kg) x 0,05 ml/kg
De exemplu, 1 litru de produs poate fi utilizat pentru pui cu o greutate corporală totală de 20000 kg.

9. Recomandări privind administrarea corectă

Cura completă de tratament trebuie administrată pentru un efect terapeutic complet.

Dacă este indicată o altă cură de tratament, intervalul dintre două cure de tratament trebuie să fie de cel puțin 3 luni.

Determinați durata (între 4 și 24 de ore) de administrare a apei medicamentate în ziua tratamentului. Această perioadă de timp trebuie să fie suficient de lungă pentru a permite tuturor păsărilor să primească doza necesară. Estimați cât vor consuma păsările apă în timpul tratamentului, pe baza consumului de apă din ziua precedentă. Produsul trebuie adăugat la un volum de apă pe care găinile îl vor consuma într-o zi. Nicio altă sursă de apă potabilă nu trebuie să fie disponibilă în timpul perioadei de medicație. Calculați volumul de produs necesar pe baza greutății totale a tuturor păsărilor din adăpostul care urmează să fie tratate.

Pentru a asigura administrarea dozei corecte, greutatea corporală trebuie determinată cât mai precis posibil și trebuie utilizat un dispozitiv de măsurare precis pentru măsurarea volumului calculat al produsului care urmează să fie administrat.

Pentru fiecare zi de tratament, apa medicamentată trebuie preparată proaspăt.

10. Perioade de așteptare

Pentru carne și organe - 14 zile;

Pentru ouă - 0 zile.

11. Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatură de la 0°C la + 30°C.

A se feri de lumină, păstrat în loc uscat, departe de alimente, surse de căldură.

Nu utilizați acest medicament de uz veterinar după data expirării marcată pe etichetă după Exp.

Termenul de valabilitate al medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 24 luni.

12. Precauții speciale pentru eliminare

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile care contribuie la protecția mediului.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar

Medicament de uz veterinar se eliberează cu prescripție.

14. Numerele certificatelor de înregistrare și dimensiunile ambalajelor

260030

Recipiente de 100 ml a câte 100 sticle/cutie, 200 ml a câte 40 sticle/cutie, 1 L a câte 10 sticle/cutie sau 5 L a câte 2 sticle/cutie. În fiecare cutie sunt incluse 2-3 copii ale instrucțiunilor și ale listei de ambalare.

15. Data ultimei revizuirii a prospectului

06/2026

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).

16. Date de contact

Deținătorul certificatului de înregistrare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

SHANDONG LUXI ANIMAL MEDICINE SHARE CO., LTD.

nr. 5, Waihuanxi Road, Qihe County, 251100, Shandong, R.P. China.

Tel: +8615165938425 Fax: +86(534)2151586

E-mail: dly0918@126.com URL: www.luxiam.com

Reprezentanți locali și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

Republica Moldova

SA „Farmavet”, MD-2059, mun. Chișinău, str. Petricani 198.

Tel.: 31-72-70; 31-72-67; 99-92-89; Fax: 31-72-68; www.farmavet.md

17. Alte informații

Codul ATC vet QP53BE02

