

PROSPECTUL

1. Denumirea medicamentului de uz veterinar

Medicox

Soluție buvabilă de uz veterinar.

2. Compoziție

100 ml MEDICOX soluție buvabilă conține:

Substanța activă:

Diclazuril – 1,0 g

Excipienți:

Dimetilsulfoxid, acid clorhidric, alcool etilic

3. Specii țintă

Păsări (porumbei decorativi).

4. Indicații de utilizare

Indicat pentru păsări - porumbei, pentru metafilaxie și tratamentul coccidiozei cauzată de specii: *Eimeria labbeana*, *Eimeria columbarum*, *Eimeria columbae*, *Eimeria tropicalis*, *Eimeria kapotei*.

5. Contraindicații

Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

A nu se utiliza la păsările producătoare de ouă pentru consumul uman.

6. Atenționări speciale

Atenționări speciale:

Nu se cunosc.

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

Momentul în timpul aplicării tratamentului este dat de cunoașterea epidemiologiei *Eimeria* spp., iar prezența coccidiei în efectiv trebuie confirmată prin prelevare de probe coprologice înainte de tratament, dacă nu există un istoric recent și confirmat de coccidioza clinică.

Coccidioza este un indicator al gradului insuficient de igienă în efectiv/ adăposturi. Se recomandă îmbunătățirea gradului de igienă și tratarea întregului efectiv de păsări din aceeași încăpere.

Precauții speciale care vor fi luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În caz de contact al produsului cu pielea sau cu ochii, clătiți din abundență cu apă.

Mâinile vor fi spălate după administrarea medicamentului de uz veterinar.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul manipulării cu medicamentul de uz veterinar.

Precauții speciale pentru protecția mediului:

Păsările tratate vor fi menținute în adăposturi pe toată durata tratamentului, iar dejecțiile de la acestea se vor colecta și nu se vor folosi la fertilizarea solului.

Păsări ouătoare:

A nu se utiliza la păsările producătoare de ouă pentru consumul uman.

Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu se cunosc.

Supradozare:

Se vor respecta dozele recomandate.

Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare:

Administrarea profilactică sau empirică, fără diagnostic coprologic prealabil, este interzisă, deoarece utilizarea nejustificată crește riscul de rezistență parazitară și expunerea inutilă a animalelor la substanța activă. Diagnosticul coprologic, utilizând metode precum flotația (Willis, Darling) sau McMaster, trebuie să confirme prezența paraziților și să identifice speciile implicate înainte de inițierea tratamentului.

Este recomandată monitorizarea coprologică înainte și după tratament pentru a confirma eficacitatea și a detecta semnele precoce ale rezistenței parazitare. Testele de reducere a numărului de ouă (FECRT) trebuie efectuate conform ghidurilor WAAVP.

Incompatibilități majore:

În lipsa studiilor de compatibilitate, acest medicament de uz veterinar nu trebuie amestecat cu alte medicamente de uz veterinar.

7. Evenimente adverse

Nu se cunosc.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactați în mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimente adverse către deținătorul certificatului de înregistrare sau reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: mvnotificare@ansa.gov.md, tel.: 022-210-156.

8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare

Se administrează per os :

Metafilactic: 0,5 ml MEDICOX/2 litri apă în decurs de 48 ore;

Tratament: 1 ml MEDICOX/2 litri apă în decurs de 48 ore.

9. Recomandări privind administrarea corectă

Medicamentul de uz veterinar se administrează per os, prin dilutie conform recomandarilor.

10. Perioade de așteptare

Termenul de așteptare pentru porumbei decorativi nu se aplică.

11. Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatura 15 - 25°C, ferit de lumină.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe ambalaj.

Termenul de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

Termenul de valabilitate după diluare în apă de băut: 24 ore.

12. Precauții speciale pentru eliminare

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile. Aceste măsuri ar trebui să contribuie la protecția mediului.

Solicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar

Medicament de uz veterinar care se eliberează cu prescripție.

14. Numerele certificatelor de înregistrare și dimensiunile ambalajelor

260031

Flacon de sticlă brună cu volumul de 10 ml, și flacoane de plastic cu volumul de 100 ml, 1 litru.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

15. Data ultimei revizuirii a prospectului

06/2026

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).

16. Date de contact

Deținătorul certificatului de înregistrare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

„Medicamentum” SRL

MD 6527, Republica Moldova, r. Anenii Noi, s. Merenii Noi,

tel/fax: +373 /265/ 62-3-17, 62-2-46, 62-4-39,

e-mail: srlmedicamentum@gmail.com

www.medicamentum.md

17. Alte informații

Codul ATCvet: QP51BC03

