

PROSPECTUL**1. Denumirea medicamentului de uz veterinar**

Mavedin 1,5, comprimate

Mavedin 5, comprimate

2. Compoziție

Un comprimat conține:

Substanța activă:

Mavedin 1.25 - 1,25 mg pimobendan;

Mavedin 5 - 5 mg pimobendan;

Excipienți: stearat de magneziu, copovidonă, dioxid de siliciu coloidal, sucraloză, glicolat de amidon sodic, arome alimentare, coloranți liposolubili și celuloză microcristalină.

Comprimate pentru uz intern.

Comprimate rotunde plate de culoare de la roz deschis până la roșu, se admite prezența incluziunilor de culoare mai întunecată sau mai deschisă.

3. Specii țintă

Câini.

4. Indicații de utilizare

Mavedin este prescris câinilor pentru tratamentul insuficienței cardiace cauzate de cardiomiopatie dilatativă (CMD) în stadiile asimptomatice (preclinice) și clinice ale bolii, precum și în stadiile clinice de degenerescență a valvei bicuspidă sau tricuspide și în stadiile clinice de degenerescență a valvei mitrale.

5. Contraindicații

Utilizarea medicamentului este interzisă în cardiomiopatia hipertrofică și în afecțiunile clinice în care debitul cardiac nu poate fi crescut din cauza caracteristicilor funcționale sau anatomice (de exemplu, stenoza aortică), în leziuni hepatice severe (datorită procesului de metabolizare a medicamentelor în acest organ) și la animalele cu hipersensibilitate individuală la componentele medicamentului.

6. Atenționări specialeAtenționări speciale:

Medicamentul nu a fost testat pentru tratamentul bolii valvulare mitrale asimptomatice (BVMA) la câini cu tahiaritmie supraventriculară și/sau ventriculară semnificativă.

Acest medicament nu este destinat utilizării la animale de la care se obțin alimente.

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

Particularitățile acțiunii în caz de administrare pentru prima dată și în caz de anulare a medicamentului nu sunt stabilite.

Evitați omiterea unor doze de medicament, deoarece acest lucru poate reduce eficacitatea terapeutică a acestuia. Dacă se omite o doză, reluați utilizarea medicamentului în aceeași doză și conform aceleiași scheme de administrare. Nu depășiți doza recomandată pentru a compensa o doză omisă.

Precauții speciale care vor fi luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Când lucrați cu Mavedin, respectați reguli generale de igienă personală și măsuri de siguranță prevăzute în timpul lucrului cu medicamente de uz veterinar.

Persoanele cu hipersensibilitate la oricare dintre componentele medicamentului trebuie să evite contactul direct cu Mavedine.

Fumatul, consumul de băuturi și mâncatul sunt interzise în timpul manipulării medicamentului.

După utilizare, spălați-vă pe mâini cu apă caldă și săpun.

În caz de contact accidental a medicamentului cu pielea sau mucoasele ochilor, clătiți imediat cu multă apă.

Dacă apare o reacție alergică sau dacă medicamentul este ingerat accidental, solicitați imediat asistență medicală (având prospectul de utilizare sau eticheta).

Precauții speciale pentru protecția mediului:

Produsul Mavedine nu trebuie lăsat să pătrundă în apele de suprafață.

Gestație și lactație:

Pentru femele în timpul gestației și alăptării, medicamentul se utilizează, dacă este necesar, sub supravegherea unui medic veterinar, pe baza unei evaluări a raportului dintre beneficiul așteptat și riscul posibil al utilizării sale.

Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Când Mavedin este utilizat concomitent cu blocante ale canalelor de calciu (verapamil, diltiazem) și un beta-blocant (propranolol), efectul pimobendanului este slăbit. Utilizarea medicamentului în combinație cu diuretice sau inhibitori ai ECA (enzimei de conversie a angiotensinei) are un efect terapeutic pozitiv suplimentar.

Nu există informații privind posibilele interacțiuni cu medicamentele de uz veterinar din alte grupuri farmacologice.

Supradozare:

În caz de supradozaj cu Mavedin, la animale pot apărea vărsături, apatie, efect cronotrop pozitiv, ataxie, sufluri cardiace și hipotensiune arterială. În acest caz, întrerupeți utilizarea medicamentului și administrați imediat tratament simptomatic (de exemplu, sorbenți).

Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare:

Nu este cazul.

Incompatibilități majore:

Când Mavedin este utilizat concomitent cu blocante ale canalelor de calciu (verapamil, diltiazem) și un beta-blocant (propranolol), efectul pimobendanului este slăbit.

7. Evenimente adverse

Când Mavedin se utilizează conform instrucțiunilor, în general nu se observă efecte secundare și complicații.

În cazuri rare pot fi observate creșterea ritmului cardiac (efect cronotrop pozitiv), vărsături, diaree, anorexie sau letargie. Micșorarea dozei de administrare permite să scadă efecte adverse.

În cazul unei sensibilități individuale crescute la medicament și apariției reacțiilor alergice, utilizarea acestuia este întreruptă, iar animalului i se prescriu antihistaminice și terapie simptomatică.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactați în mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimente adverse către deținătorul certificatului de înregistrare sau reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: mvnotificare@ansa.gov.md, tel.: 022-210-156.

8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare

Mavedin se administrează oral animalelor individual, cu 0,5-1 oră înainte de hrănire. Administrarea cu alimente poate reduce biodisponibilitatea acestuia.

Medicamentul este prescris într-o doză zilnică de 0,2 mg până la 0,6 mg la 1 kg greutate corporală.

Doza zilnică este împărțită în două administrări egale.

Doza, frecvența administrării și durata tratamentului sunt determinate individual de către medicul veterinar, în funcție de indicație, severitatea bolii, greutatea corporală și starea animalului.

Doza cea mai convenabilă este Mavedin 1.25 pentru animalele cu greutatea corporală de până la 5 kg, Mavedin 5 pentru animalele cu greutatea corporală între 5 și 20 kg.

Doza recomandată pentru obținerea unui efect clinic este de 0,5 mg per 1 kg greutate corporală pe zi.

Greutatea corporală (kg)	Doza zilnică mg,	Numărul de comprimate pentru utilizarea zilnică			
		Dimineața (Doza SA la o administrare)		Seara (Doza SA la o administrare)	
		1,25 mg	5 mg	1,25 mg	5 mg
< 3	0,6	¼	-	¼	-
4-5	1,25	½	-	½	-
5-10	2,5	1	¼	1	¼
11-20	5	2	½	2	½
21-30	7,5	-	¾		¾
31-40	10	-	1		1
41-50	15	-	1½		1½
51-60	20	-	2		2
> 61		-	3		3

9. Recomandări privind administrarea corectă

Pentru a determina mai precis doza în funcție de greutatea corporală a animalului, comprimatul poate fi împărțit de-a lungul liniilor de separare.

În cazul insuficienței cardiace congestive, medicamentul este utilizat la câini pe viață, cu ajustări individuale ale dozei.

În timpul tratamentului cu pimobendan la câinii care suferă de diabet zaharat, se recomandă monitorizarea regulată a nivelului de glucoză din sânge.

10. Perioade de așteptare

Nu este cazul.

11. Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatură de la +2°C la +25°C, la o umiditate relativă de maximum 65%.

A se păstra ferit de razele solare directe, separat de produse alimentare și furaje.

Nu utilizați acest medicament de uz veterinar după data expirării marcată pe etichetă după Exp. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Termenul de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 4 luni.

Termenul de valabilitate pentru comprimatele înjumătățite neutilizate, după prima deschidere a ambalajului primar: 48 ore.

12. Precauții speciale pentru eliminare

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile care contribuie la protecția mediului.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar

Medicament de uz veterinar se eliberează cu prescripție.

14. Numerele certificatelor de înregistrare și dimensiunile ambalajelor

Mavedin 1,5, comprimate - 260040

Mavedin 5, comprimate – 260041

Mavedin este disponibil în blistere a câte 10 comprimate sau în flacoane din sticlă închisă la culoare a câte 30, 50 sau 100 de comprimate. Flacoanele sunt sigilate ermetic cu capace polimerice cu filet, cu verificare la prima deschidere. Blisterele a câte 3, 5 sau 10 comprimate sunt ambalate în cutii de carton. Flacoanele sunt ambalate individual în cutii de carton. Flacoanele cu comprimate pot fi furnizate cu un tampon desicant, cu sau fără vată.

Fiecare ambalaj include instrucțiuni de utilizare.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

15. Data ultimei revizui a prospectului

07/2026

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).

16. Date de contact

Deținătorul certificatului de înregistrare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

SRL "NITA-PHARM", Federația Rusă, 410010, or Saratov, str. Osipova V.I, nr. 1

Tel: +7(8452) 338600

e-mail: client@nita-farm.ru

Reprezentanți locali și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

Republica Moldova

SRL "ZooFarmAgro",

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Dacia 61H

Te.: 022 855 073/069 827 427;

e-mail: zoofarmagro@mail.ru; www.zoofarmagro.md; www.zooshop.md

17. Alte informații

Codul ATCvet: QC01CE90