

PROSPECTUL

1. Denumirea medicamentului de uz veterinar

ANTIHELM TRIO 0.8 g comprimate

Pentru câini și pisici

2. Compoziție

1 comprimat 0.8 mg conține:

Substanțele active:

Fenbendazol 200 mg,

Pyrantel pamoat 144 g

Praziquantel 50 mg.

Excipienți: amidon de cartofi, stearat de calciu, aromatizator, lactoză.

3. Specii țintă

Câini și pisici

4. Indicații de utilizare

Dehelmintizare la câini, pisici afectați de:

Nematode (stadiile larvare și adulte) - *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma spp*, *Uncinaria spp*, *Trichuris vulpis*, *Strongyloides stercoralis*;

Cestode (formele preimaginale și imaginale) - *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*, *Echinococcus granulosus*, *Mesocestoides spp*;

Trematode – *Opisthorchis felinus*, *Alaria alata*, *Pseudamphistomum truncatum*, *Echinococcus perfoliatus*.

5. Contraindicații

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate cunoscută la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.

A nu se administra la cățeluși cu vârsta sub 4 săptămâni!

A nu se administra la pisicuțe cu vârsta sub 6 săptămâni!

Nu administrați animalelor slăbite și bolnave!

Nu administrați animalelor cu insuficiență renală sau hepatică.

6. Atenționări speciale

Atenționări speciale:

Nu există.

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

A se utiliza conform indicațiilor prezentate în prospect.

A se administra conform dozelor recomandate.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Atunci când lucrați cu produsul, respectați regulile generale de igienă personală și regulile privind manipularea medicamentelor de uz veterinar.

Gestație

A nu se administra la animale gestante cu o săptămână înainte de fătare sau 2 săptămâni după fătare.

Lactație

Produsul poate fi administrat femelelor în perioada de lactație, cu condiția ca cățelușii să aibă vârsta de 4 săptămâni, iar pisicuțele să aibă vârsta de 6 săptămâni.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune

Nu se administrează în combinație cu derivați de piperazină, levamisol, compuși organofosforici și alte medicamente cu acțiune colinergică.

Supradozare

Nu au fost raportate simptome de supradozare la utilizare produsului în dozele recomandate.

În cazul utilizării la câini a unor doze de 3-5 ori mai mari decât cele recomandate și atunci când sunt administrate pentru o perioadă de două ori mai lungă decât cea recomandată, nu apar semne clinice de supradozaj.

Pisicile sunt mai sensibile, iar în caz de supradozaj, simptomele pot include depresie, vărsături, diaree, care dispar rapid fără utilizarea de agenți terapeutici.

Nu există antidoturi speciale.

Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare:

Nu este cazul.

7. Evenimente adverse

În unele cazuri, la unele animale cu invazie severă pot apărea diaree, vărsături, urticarie și mâncărime în rect și anxietate. Aceste simptome dispar rapid, fără nicio intervenție adițională.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactați mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimente adverse către deținătorul certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: mvnotificare@ansa.gov.md, tel.: 022-210-156.

8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare

Calea de administrare: orală

Dozele de produs sunt următoarele:

20 mg fenbendazol, 14,4 mg pyrantel pamoat și 5 mg praziquantel per 1 kg greutate corporală a animalului sau 1 comprimat de 0,8 g per 10 kg greutate corporală a animalului

Dozele medicamentului de uz veterinar, în funcție de greutatea corporală și de greutatea comprimatului:

greutatea corporală, kg	numărul de comprimate de 0.8g
1-2,5	1/4
>2,5-5	1/2
>5-10	1
>10-15	1 1/2
>15-20	2
>20-30	3
>30-40	4

9. Recomandări privind administrarea corectă

Comprimatele se administrează animalelor împreună cu hrana sau forțat. Nu este necesară o dietă de înfometare prealabilă sau un regim alimentar special.

Comprimatele pot fi înjumătățite sau împărțite în sferturi pentru animalele cu o greutate corporală mai mică de 10 kg.

Dehelmintizarea cu scop terapeutic a animalelor se efectuează o singură dată.

Dacă este necesar, conform indicațiilor, tratamentul poate fi repetat după 10-14 zile.

Dehelmintizarea cu scop preventiv a animalelor se efectuează o dată pe trimestru în doză terapeutică, precum și înainte de împerechere și cu 12-14 zile înainte de vaccinare.

10. Perioada de așteptare

Nu este cazul.

11. Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra în loc uscat, ferit de lumină, la o temperatură între 5°C și 25°C, inaccesibil animalelor.

Nu utilizați acest medicament de uz veterinar după data expirării marcată pe ambalaj, după Exp.:. Data expirării se referă la ultima zi din acea lună.

12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINARE

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau deșeuri menajere.

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile. Aceste măsuri ar trebui să contribuie la protecția mediului.

Solicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar

Medicament de uz veterinar care se eliberează cu prescripție.

14. Numerele certificatului de înregistrare și dimensiunile ambalajului

260044

Ambalat câte 1 comprimat. Câte 10 sau 20 ambalaje în cutie de carton.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate

15. Data ultimei revizuirii a prospectului

07/2026

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova – Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).

16. Date de contact

Deținătorul certificatului de înregistrare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Vetsintez LLC

61001 Kharkiv, str. Taras Bobanych 30, Ucraina

Tel: +380577143751

E-mail: info@vetsintez.com, www.vetsintez.com.ua

Reprezentanți locali și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare

Republica Moldova

Univet Farm SRL

str. Fântânilor 2, Trușeni, mun. Chișinău

Tel: +37368366651

univetfarm@gmail.com

17. Alte informații

Cod ATCvet: QP52AA01 – praziquantel, QP52AF02 – pyrantel, combinații.

