

PROSPECTUL

1. Denumirea medicamentului de uz veterinar

Cyper-Pert 100
Concentrat emulsionabil

2. Compoziție

Substanța activă:

Cipermetrină 100 mg / ml

Excipienți:

Emulgator 80 mg/ml
Solvesso 100 până la 1 ml

Concentrat emulsionabil de uz extern.

3. Specii țintă

Bovine și ovine

4. Indicații de utilizare

Cyper-Pert 100, o emulsie stabilă în apă, este indicat pentru tratamentul ectoparazitozelor la bovine și ovine, fiind foarte eficient împotriva păduchilor hematofagi și malofagi, muștelor, căpușelor, larvelor de muște și acarienilor (*Psoroptes spp.*, *Sarcoptes spp.* și *Chorioptes spp.*).

5. Contraindicații

Nu se utilizează la miei cu vârsta mai mică de o săptămână.

Nu se administrează animalelor cu greutatea corporală mai mică de 12,5 kg, pentru prevenirea miazelor cutanate.

Evitați tratarea mieilor foarte tineri în perioade când vremea este mai călduroasă decât normal pentru sezonul respectiv.

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

6. Atenționări speciale

Atenționări speciale:

Utilizarea frecventă și repetată a antiparazitarilor din aceeași clasă poate crește riscul de dezvoltare a rezistenței.

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

Concentratul este extrem de inflamabil. Toxic! Citiți cu atenție prospectul înainte de utilizare! Toxic pentru pisici, păsări, albine, pești sau alte animale din apele dulci și marine. Nu utilizați medicamentul pe timp ploios, deoarece eficacitatea tratamentului va fi redusă.

Se recomandă să nu se aplice produsul direct pe coada mielului, deoarece oaia îl recunoaște parțial după mirosul acestei zone.

Muștele care provoacă miază cutanată sunt atrase de lâna murdară sau umedă și de plăgile deschise. Infestarea apare cel mai frecvent la nivelul crupei, din cauza murdăririi cu fecale diareice sau urină. Eficacitatea medicamentului scade dacă lâna este contaminată sau murdară, de aceea oile trebuie tunse regulat în zona posterioară și trebuie aplicate măsurile corespunzătoare de control al paraziților intestinali.

Evitați contactul ocular al medicamentului la ovine. Această precauție trebuie respectată în mod special la tratarea raselor cu lână puțină la nivelul capului.

Animalele nu trebuie să ingereze sau să inhaleze aerosolul rezultat în timpul pulverizării.

Asigurați accesul animalelor la apa de băut înainte de tratament.

Evitați tratarea animalelor ude sau aplicarea emulsiei în condiții de umiditate ridicată.

Nu tratați animalele slăbite, stresate sau bolnave, cu excepția cazului în care este recomandat de un medic veterinar.

Instrucțiuni complete de operare și întreținere, inclusiv pentru duze, sunt furnizate împreună cu fiecare pistol pentru aplicare Pour-On. Citiți-le cu atenție înainte de utilizare. Întrețineți cu grijă pistolul pentru a asigura dozarea corectă.

Numai pentru uz extern.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Acest medicament este dăunător dacă este ingerat și poate cauza iritații ale pielii, ochilor sau tractului respirator. Acest medicament poate cauza, de asemenea, reacții de hipersensibilitate.

Evitați contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați accesul copiilor la produs sau la animalele tratate.

Utilizați într-o zonă bine ventilată și evitați inhalarea vaporilor.

Purtați echipament de protecție oculară, îmbrăcămintă de protecție, mănuși și cizme de cauciuc la administrarea medicamentului și la manipularea animalului până când medicamentul nu s-a uscat.

Purtați o mască de protecție de unică folosință la aplicarea prin pulverizare pentru prevenirea miazelor cutanate.

Asigurați-vă că, la atașarea pistolului aplicator recomandat la recipient, dispozitivul de fixare spiralat este fixat corect atât pe capac, cât și pe aplicator.

În caz de contact accidental cu pielea sau ochii, spălați imediat cu apă curată din abundență. Dacă iritația persistă, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.

Îndepărtați imediat îmbrăcămintea contaminată și spălați pielea expusă cu apă curată din abundență.

Consumul de alimente, băuturi și fumatul sunt interzise în timpul utilizării medicamentului de uz veterinar.

Spălați-vă foarte bine mâinile, fața și orice zonă expusă, după utilizare.

Îndepărtați imediat îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.

Toate echipamentele utilizate pentru aplicarea emulsiei trebuie curățate la finalizarea tratamentului.

Dacă apar semne de intoxicație sau stare de rău (precum senzație de furnicături la nivelul pielii, amețeli, dureri de cap, greață), întrerupeți imediat activitatea și solicitați sfatul medicului.

În caz de contact accidental cu pielea, spălați imediat cu săpun și apă din abundență.

În caz de contact accidental cu ochii, clătiți imediat cu apă din abundență timp de cel puțin 15 minute și solicitați sfatul medicului.

Evitați ingestia sau inhalarea aerosolului rezultat în timpul pulverizării. În caz de ingestie accidentală sau contact cu gura, clătiți imediat gura cu apă din abundență și solicitați sfatul medicului.

Note privind toxicitatea (specifice pentru cipermetrină):

Expunerea la cipermetrină poate provoca iritații ale pielii, furnicături, amorțeală sau senzație de arsură, precum și greață ori amețeli în caz de doze mari.

Tratamentul este exclusiv simptomatic (nu există antidot specific pentru intoxicația cu piretroizi). Terapia de susținere poate include măsuri pentru gestionarea simptomelor, precum iritațiile, reacțiile alergice sau dificultățile respiratorii.

NU administrați atropină sau pralidoxim, deoarece ele sunt contraindicate în caz de intoxicație cu piretroizi.

Evitați utilizarea stimulentei sistemului nervos central, precum teofilina sau aminofilina.

Precauții speciale pentru protecția mediului:

Cipermetrina este extrem de toxică pentru organismele acvatice și organismele din bălegar.

Ca măsură de precauție, accesul oilor la cursurile de apă este interzis timp de cel puțin 12 ore după tratament (vezi "Precauții speciale pentru protecția mediului"). Ținând cont de riscurile pentru mediul înconjurător, utilizarea medicamentului de uz veterinar trebuie limitată la un singur tratament pe an pentru fiecare pășune.

Nu pot fi excluse efectele pe termen lung asupra insectelor de bălegar, cauzate de utilizarea continuă sau repetată a ectoparaziticidelor piretroide. Prin urmare, repetarea administrării unui produs pe bază de piretroizi la animalele aflate pe aceeași pășune, în cursul aceluiași sezon, este permisă doar în absența unor tratamente sau strategii alternative pentru menținerea sănătății animalelor/turmei, conform recomandării medicului veterinar.

Gestație:

Poate fi utilizat în perioada de gestație. Se utilizează la animale gestante cu precauție.

Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Medicamentul trebuie aplicat numai cu pistolul de aplicare recomandat, deoarece poate provoca deteriorarea anumitor componente ale pistoalelor de dozare convenționale.

Supradozare:

La mamifere semnele de toxicitate se manifestă prin tremor, hiperexcitabilitate, salivăție, coree, atetoză și paralizie, care rareori pot duce la moartea animalului. De obicei, semnele dispar rapid și animalele se recuperează, de regulă, în decurs de o săptămână.

Nu există nici un antidot specific, dar se poate administra tratament simptomatic, dacă este necesar.

Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare:

Nu este cazul.

Incompatibilități majore:

Se descompune în mediu acid sau alcalin.

7. Evenimente adverse

Nu se cunosc.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactați mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimente adverse către deținătorul certificatului de înregistrare sau reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: mvnotificare@ansa.gov.md, tel. 022-210-156.

8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare

Numai pentru uz extern, prin pulverizare.

Medicamentul de uz veterinar se administrează după diluare, în conformitate cu dozele de utilizare recomandate.

Pentru combaterea muștelor la ovine și bovine, emulsia se prepară prin diluarea **1 ml de Cyper-Pert 100 în 1 litru de apă**.

Emulsia pentru pulverizare trebuie preparată imediat înainte de utilizare, asigurându-se amestecarea continuă pentru obținerea unei dispersii omogene.

Volumul de emulsie preparată prin diluție, per animal, este precum urmează:

- Bovine adulte : 500 ml
- Bovine tinere și ovine : 250 ml
- Viței: 125 ml.

Pentru combaterea păduchilor și căpușelor, se diluează **75 ml de Cyper-Pert 100 în 50 litri de apă.**

9. Recomandări privind administrarea corectă

Tratamentul de grup trebuie efectuat pe vreme uscată, preferabil dimineața. Tratamentul trebuie aplicat simultan întregului efectiv de animale. Pulverizarea trebuie efectuată cu precauție, pentru a evita ingestia sau inhalarea de către animale. Animalele pot fi tratate individual, în aer liber sau în încăperi bine ventilate. Frecvența tratamentelor depinde de gradul de infestare, de stadiul ciclului de viață al ectoparaziților și de condițiile de mediu.

Pentru eficacitate maximă, emulsia de lucru trebuie utilizată în ziua în care a fost preparată.

Atunci când este utilizat pentru combaterea insectelor în adăposturile pentru animale, întregul spațiu, inclusiv echipamentele și suprafețele, trebuie pulverizat minuțios cu soluția diluată conform instrucțiunilor. Pulverizarea se va efectua de către personal calificat și doar în încăperi în care nu sunt prezente animale.

10. Perioade de așteptare

Carne și organe: 8 zile.

Lapte: 5 zile.

11. Precauții speciale pentru depozitare

A se păstra produsul bine închis în loc uscat, aerisit și inaccesibil.

A închide etanș recipientul după utilizare.

Produsul este inflamabil.

A se feri de lumina directă a soarelui și a se păstra la temperaturi între -10°C și +25°C.

Termenul de valabilitate al medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

Termenul de valabilitate după diluare conform indicațiilor: 24 ore.

12. Precauții speciale pentru eliminare

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.

Acest medicament de uz veterinar nu trebuie să ajungă în cursurile de apă, deoarece cipermetrina este extrem de periculos pentru organismele acvatice. Nu contaminați lacurile, râurile sau canalele cu acest medicament de uz veterinar sau cu ambalajul gol al acestuia.

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile. Aceste măsuri ar trebui să contribuie la protecția mediului.

Solicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar

Medicament de uz veterinar care se eliberează cu prescripție.

14. Numerele certificatelor de înregistrare și dimensiunile ambalajelor

260046



Flacoane de sticlă maro de 25 ml, 30 ml, 50 ml;
Flacoane HDPE de 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 litru
Canistre HDPE de 5 litri, 20 litri, 25 litri

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.>

15. Data ultimei revizuirii a prospectului

07/2026

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova – Registrul de stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md>).

16. Date de contact

Deținătorul certificatului de înregistrare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

JEVETCO

Almoaqar 300- Amman
Iordania

Reprezentanți locali și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

Republica Moldova
"Viovant" S.R.L.
str. P. Ștefănuță, 60
or. Ialoveni, 6801-MD
Tel. +37360455822
E-mail: info@viovant.md

17. Alte informații

Codul ATCvet: QP53AC08

